

Electronic Journal of Polish Agricultural Universities is the very first Polish scientific journal published exclusively on the Internet, founded on January 1, 1998 by the following agricultural universities and higher schools of agriculture: University of Technology and Agriculture of Bydgoszcz, Agricultural University of Cracow, Agricultural University of Lublin, Agricultural University of Poznan, Higher School of Agriculture and Teacher Training Siedlce, Agricultural University of Szczecin, and Agricultural University of Wroclaw.



**ELECTRONIC
JOURNAL
OF POLISH
AGRICULTURAL
UNIVERSITIES**

**2004
Volume 7
Issue 2
Series
FORESTRY**

Copyright © Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ISSN 1505-0297
KAZMIERCZAK T. 2004. CHECKLIST OF ICHNEUMONIDAE (HYMENOPTERA) OF POLAND **Electronic Journal of Polish Agricultural Universities**, Forestry, Volume 7, Issue 2.
Available Online <http://www.ejpau.media.pl>

**CHECKLIST OF ICHNEUMONIDAE (HYMENOPTERA)
OF POLAND**

Tadeusz Kaźmierczak

Department of Forest Entomology Agricultural University in Cracow, Poland

[ABSTRACT](#)
[INTRODUCTION](#)
[RESULTS](#)
[REFERENCES](#)
[FOOTNOTES](#)

ABSTRACT

Ichneumonidae occur in all continents. They inhabit mainly terrestrial habitats but aquatic species are also known. Body size of imagines varies from 3 to 35 mm, and together with ovipositor it reaches to 165 mm. Long, straight antennae almost always consist of more than 16 segments. In the composition of thorax there is an additional intermediate segment (propodeum), originated as a result of uniting metathorax and the first segment of abdomen. The intermediate segment is divided by carinae into many areas. On both sides of the first tergite, before a spiracle, there occur longitudinal depressions - glymmae. Connection between the second and third tergites of the abdomen is flexible. Trochanters are usually double and middle tibia are provided with two calcars (rarely one). Wing stigma is well-marked. In most of species the fore-wing has second recurrent vein; areolet may also occur. Rarely, wings are completely lacking or reduced.

Eggs of Ichneumonidae are reckoned among the four main types: hymenopteroidal, acuminate, pedicellate and on a stem.

Larva is of the type of worm, without legs. There are five developmental stages of larva.

The life span of imagines is 1-2 months. Some of them winter in the stage of imago, which prolongates their life to 10 months. Males appear about one week earlier than females. Ichneumonidae reproduce sexually and parthenogenetically. Fecundity of females ranges between 20-30 eggs to a few thousand eggs.

They are ecto- or endoparasites of larvae and pupae of other insects, rarely spiders or their eggs; mostly oligophagous or poliphagous. The majority of species are primary parasites but secondary parasites and cleptopasites have also been found. Ichneumonidae are of big economic importance because they are, among others, parasites of forest, orchard and field insect pests.

They were and in future may be to a greater extent used in pest control. They also serve as an object of studies on polydnaviruses reducing the resistance of insects.

As the knowledge of this family is rather poor, it is difficult to identify endangered, relict or endemic species. One may indicate rare species in some groups.

The checklist contains 3184 species of Ichneumonidae up to now recognized in Poland. They represented 34 subfamilies. The list is based on 216 literary sources, collections of privates and museums.

Key words: Hymenoptera, list of Ichneumonidae, Poland.

INTRODUCTION

In 1997 the fifth volume of the List of animals of Poland [142] was published. It contained the description of the order of Hymenoptera, except for the largest family, Ichneumonidae. I think that the present list fills that gap. The list comprises 3.184 species from 34 subfamilies entering into the composition of the family, reported so far from Poland. The subfamilies and orders were given in the systematic order according to D.S. Yu and K. Horstmann [214, 215]. In the future this list will certainly be extended; one may suppose that the fauna of Ichneumonidae of our country comprises about 4.000 species. In addition to the binding species names, the most often used synonyms are given in small print.

Ichneumonidae are one of the richest insect families and rather poorly known. According to D.S. Yu and K. Horstmann [214, 215] the family of Ichneumonidae includes 21.805 existing species and 153 fossil species.

H. Townes et al. [188,191] and H. Townes [192,193] elaborated catalogues of the world fauna of Ichneumonidae species and genera, introducing considerable changes as compared with the earlier accepted nomenclature. The assignation of many species to genera was also changed. Next, E. H. Diller and K. Horstmann [19-21], I. D. Gauld [24], K. Horstmann [57-72], D.B. Wahl [194-203], D.B. Wahl and I.D. Gauld [204,205], I.D. Wahl and W.R.M. Mason [206], and D.R. Kasparyan [76,77], J.P.E.F. Stein [177], W.I.Tobias[179] and V.I.Tolkanitz [180], revised the particular subfamilies within the family of Ichneumonidae; this work has been completed as yet. New species and new systematic arrangements were presented by the lately published catalogue of D.S. Yu and K. Horstmann [215, 216].

In Poland 516 genera (in the world 1.485) and about 3.200 species of Ichneumonidae have so far been known. They belong to 34 subfamilies (in the world 39). These are: Acaenitinae, Adelognatinae, Agriotypinae, Anomaloninae, Banchinae, Brachycyrtinae, Campopleginae, Collyriinae, Cremastinae, Cryptinae, Ctenopelmatinae, Cylloceriinae, Diacritinae, Diplazontinae, Eucerotinae, Ichneumoninae, Lycorininae, Mesochorinae, Metopiinae, Microleptinae, Neorhacodinae, Ophioninae, Orthocentrinae, Orthopelmatinae, Oxytorinae, Paxyloommatainae, Phrudinae, Pimplinae, Poemeniinae, Rhyssinae, Stilbopinae, Tersilochinae, Tryphoninae, Xoridinae. Ichneumonidae are parasitoids of the larvae and pupae of other insects, rarely of spiders, or their eggs. These are never parasitoids of the imagoes or nymphae of insects with incomplete metamorphosis (hemimetabola). If they are parasites of eggs (some Ctenopelmatinae, Diplazontinae, sometimes Collyria), their larvae complete their development in the larvae or pupae of a host. The hosts of Ichneumonidae are most often hymenopterans, coleopterans and butterflies, and rarely neuropterous, raphidiopterous, caddis-flies and spiders.

In the present area of Poland Ichneumonidae were studied by such entomologists as: C.G.A. Brischke [6-14] in Eastern Pomerania, R. Dittrich [22] and K. Hedwig [38,39] in Pojezierze Myśliborskie (Myśliborz Lake District) and Pojezierze Lubuskie (Lubuskie Lake Districts), J. Noskiewicz [129,130], J. Noskiewicz et al.[131] and M. K. Kościelska [121-124] in Silesia, V. Torka [181-187] in Wielkopolska and Pomerania, R. Błędowski and K. Krainska [3-5], H. Piekarska [135, 136], H. Piekarska-Boniecka [137,138], H. Piekarska and B. Kuźmierzak [139], H. Piekarska-Boniecka, J. Sawoniewicz [140] in the eastern regions of Poland, J. Głowacki [26-29], B. Miczulski [128], W. Winiarska and A. Anasiewicz [212], and J. Sawoniewicz [144-164] in Mazowsze, Bory Tucholskie (Tuchola Forest), Puszcza Biała (Biała Forest) and Puszcza Białowieska (Białowieża Forest). Ichneumonidae of Pojezierze Pomorskie (Pomeranian Lake District), mainly of the region of Sepólno Krajeńskie, were described by G. Heinrich [40-48], while in southern Poland they were investigated by T. Kaźmierzak [78-116], T. Kaźmierzak and J. Dąbrowski [117], T. Kaźmierzak and W. Ostapski [118], S. Wiąckowski [207-211] and B. Źak [216].

The author made use of publications by J.F. Aubert [1,2] R.M. Constantineanu and M.I. Constantineanu [15], M.I. Constantineanu and C. Pisica [16], catalogues by M.G. Fittona [23], I.D. Gauld and P.A. Mitchell [25], keys by H. Goulet and J. Huber [30], and papers by L.L.C. Gravenhorst [31-37], W. Hellén [49,50], G.H. Heinrich [40-48], R. Hinz [52-56], S. Kapuściński [73], J. Karczewski [74,75], D. R. Kasparyan [76,77], J. Kerrich [120], I. Kucharczyk and S. Wiąckowski [125], G.S. Medvedev [126], N.F. Meyer [127], A.P. Rasnitsyn [141], E. Schimitschek [168,169], O. Schmiedeknecht [170,171], Schwarz [172-173], M. Schwarz and H. Rieman [174], J. Šedivý [175,176], M. W.R Thompson [178].

In addition to the mentioned above catalogues and papers, the list of species by K. W. Dalla Torre, C. G. Dalla Torre [17], E. H. Diller [18], B. Herting [51], J. Oehlke [132-134] a bibliography by H. Sachtleben [143], papers J. Sawoniewicz and J. Buszko [165], J. Sawoniewicz and J. Luman [166], and D.S.Yu [213] were also taken into account. The author examined museum collections, housed in the Institute of Animals Systematics and Evolution of the Polish Academy of Sciences in Kraków, Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences in Warszawa, Zoological Museum of the Wrocław University, Institute of Forest Protection of the Agricultural University (SGGW) in Warszawa, Institute of Forest Protection of the Agricultural University in Poznań, Institut für Spezielle Zoologie und Zoologische Museum, Humboldt Universität in Berlin and the private collections of S. Kapuściński and W. Strojny. The list was completed with the author's unpublished materials.

Explanation:

? – the taxonomic positions are uncertain because the type specimen are lost and/or the taxa have not been revised.
ssp. – for subspecies.

var. – for variety.

f. – for form.

RESULTS

Acaenitinae Foerster, 1869

Acaenitini Foerster, 1869

Acaenitus Latreille, 1809

– *dubitator* (Panzer, 1800)

Arotes Gravenhorst, 1829

Asthrenomerus Foerster, 1869

Sphalerus Kriechbaumer, 1878

– *albicinctus* Gravenhorst, 1829

– *annulicornis* Kriechbaumer, 1894

– *ustulatus* Kriechbaumer, 1894

Phaenolobus Foerster, 1869

Ichneumon arator Rossi, 1790

Chorischizus Foerster, 1869

Moldacenitus areolator Constantineanu & Constantineanu, 1968

– *areolator* (Constantineanu & Constantineanu, 1968)

– *atrator* (Constantineanu & Pisica, 1977)

– *fraudator* Bauer, 1961

– *fulvicornis* (Gravenhorst, 1829)

– *maior* Szépligeti, 1914

– *mucronatus* (Constantineanu & Constantineanu, 1968)

– *saltans* (Gravenhorst, 1829)

– *terebrator* (Scopoli, 1763)

Coleocentrini Clément, 1938

Coleocentrus (Gravenhorst, 1829)

Ichneumon excitator Poda, 1761

– *caligatus* Gravenhorst, 1829

– *croceicornis* (Gravenhorst, 1829)

– *exareolatus* Kriechbaumer, 1894

– *excitator* (Poda, 1761)

– *incertus* (Ashmead, 1906)

– *soldanskii* Bischoff, 1915

Leptacoenites Strobl, 1902

– *notabilis* (Desvignes, 1856)

Mesoclistus Foerster, 1869

– *rufipes* (Gravenhorst, 1829)

Adelognathinae Thomson, 1888

Adelognathus Holmgren, 1857

Adelognathus brevicornis Holmgren, 1857

Notomerix Foerster, 1869

Cnemischys Foerster, 1869

– *acantholydae* Kasparyan, 1986

– *aciculatus* Thomson, 1887

– *brevicornis* Holmgren, 1857

– *britannicus* Perkins, 1943

– *chrysopygus* (Gravenhorst, 1829)

– *ctenonyx* Kasparyan, 1986

– *cubiceps* Roman, 1925

– *diformis* Holmgren, 1857

- *dorsalis* (Gravenhorst, 1829)
- *facialis* Thomson, 1887
- *laevicollis* Thomson, 1887
- *marginellus* Holmgren, 1857
- *pallipes* (Gravenhorst, 1829)
- *pilosus* (Thomson, 1888)
- *puncticollis* Thomson, 1887
- *punctulatus* Thomson, 1887
- *rufithorax* Kasparyan, 1990
- *stelfoxi* Fitton, 1982
- *tenthredinarum* (Giraud, 1872)
- *tetratinctorius* (Thunberg, 1822)
- *thomsoni* Schmiedeknecht, 1911
- *angularis* Kasparyan, 1990

Agriotypinae Haliday, 1838

- Agriotypus* Curtis, 1832
- Agriotypus armatus* Curtis, 1832
 - Crotopus* Holmgren, 1859
 - *armatus* Curtis, 1832

Anomaloninae Viereck, 1918

Anomalonini Viereck, 1918

- Anomalon* Panzer, 1804
- Anomalon cruentatus* Panzer, 1804
 - Trachynotus* Gravenhorst, 1829
 - *cruentatum* (Geoffroy, 1785)
 - Ichneumon cruentatus* Geoffroy, 1785

Gravenhorstiini Enderlein, 1912

- Agrypon* Foerster, 1860
- Ophion flaveolatum* Gravenhorst, 1807
 - Trichionotus* Cameroon, 1905
 - *anomelas* (Gravenhorst, 1829)
 - *anxium* (Wesmael, 1849)
 - *canaliculatum* (Ratzeburg, 1944)
 - *clandestinum* (Foerster, 1860)
 - *delarvatum* (Gravenhorst, 1829)
 - *flaveolatum* (Gravenhorst, 1807)
 - *flexorium* (Thunberg, 1822)
 - *hilare* (Tosquinet, 1889)
 - *rugifer* (Thomson, 1894)

- *varitarsum* (Wesmael, 1949)
 - Aphanistes* (Foerster, 1869)
 - Anomalon bellicosum* Wesmael, 1849
 - *bellicosus* (Wesmael, 1849)
 - *gliscens* (Hartig, 1838)
 - *klugii* (Hartig, 1838)
 - *ruficornis* (Gravenhorst, 1829)
 - Atrometus* Foerster, 1869
 - Atrometus insignis* Foerster, 1878
 - *insignis* (Foerster, 1878)
 - Barylypa* Foerster, 1869
 - Anomalon genalis* Thomson, 11892
 - Laphyctes* Foerster, 1869
 - *amabilis* (Tosquinet, 1900)
 - *delictor* (Thunberg, 1822)
 - *insidiator* (Foerster, 1878)
 - *longicornis* (Brauns, 1895)
 - *pallida* (Gravenhorst, 1829)
 - *paradoxa* (Brauns, 1895)
 - *uniguttata* (Gravenhorst, 1829)
 - Erigorgus* Foerster, 1869
 - Anomalon fibulator* Gravenhorst, 1829
 - *apollinis* Kriechbaumer, 1900
 - *cerinops* (Gravenhorst, 1829)
 - *fibulator* (Gravenhorst, 1829)
 - *leucopus* (Szépligeti, 1905)
 - *melanobatus* (Gravenhorst, 1829)
 - *melanops* (Foerster, 1855)
 - *procerus* (Gravenhorst, 1829)
 - *propugnator* (Foerster, 1855)
 - *villosus* (Gravenhorst, 1829)
 - Gravenhorstia* Boie, 1836
 - Gravenhorstia picta* Boie, 1836
 - *picta* Boie, 1836
- Habrocampulum* Gauld, 1976
- Anomalon biguttatum* Gravenhorst, 1829
 - *biguttatum* (Gravenhorst, 1829)
 - Habronyx* Foerster, 1869
 - Habronyx (Camposcopus)* Foerster, 1869
 - Anomalon nigricornis* Wesmael, 1849
 - *nigricornis* (Wesmael, 1848)
 - Habronyx (Habronyx)* Foerster, 1869
 - *heros* (Wesmael, 1849)
 - Heteropelma* Wesmael, 1849
 - Heteropelma calcator* Wesmael, 1849
 - *amictum* (Fabricius, 1775)
 - Ichneumon amictus* Fabricius, 1775

- *megarthrum* (Ratzeburg, 1848)
- *signatum* (Gravenhorst, 1829)
 - Parania* Morley, 1913
 - Parania nototrachoides* Morley, 1913
- *geniculata* (Holmgren, 1857)
 - Anomalon geniculatum* Holmgren, 1857
- Perisphincter* (Townes, 1961)
- *brevicollis* (Wesmael, 1849)
 - Anomalon brevicolle* Wesmael, 1849
- *gracilicornis* Schnee, 1978
- Therion* Curtis, 1829
 - Ichneumon circumflexus* Linnaeus, 1758
 - *brevicornis* (Gravenhorst, 1829)
 - *circumflexum* (Linnaeus, 1758)
 - *ericae* Bauer, 1967
 - *giganteum* (Gravenhorst, 1829)
 - *signatum* (Gravenhorst, 1829)
 - Trichomma* (Wesmael, 1849)
 - Trichomma fulvidens* Wesmael, 1849
 - *enecator* (Rossi, 1790)
 - *fulvidens* Wesmael, 1849
 - *intermedium* Krieger, 1904
 - *occisor* Habermehl, 1909
- Banchinae Wesmael, 1845**
- Atrophini Seyrig, 1932**
- Alloplasta* Foerster, 1869**
 - Assymictus* Foerster, 1869
 - Ichneumon piceator* Thunberg, 1822
 - *nigripes* (Meyer, 1930)
 - *piceator* (Thunberg, 1822)
 - *plantaria* (Gravenhorst, 1829)
 - Phytodietus plantarius* Gravenhorst, 1829
- Arenetra* (Holmgren, 1859)**
 - Lasiops* Holmgren, 1856
 - *pilosella* (Gravenhorst, 1829)
- Cryptopimpla* (Taschenberg, 1863)**
 - Aphanodon* Foerster, 1869
 - *calceolata* (Gravenhorst, 1829)
 - *errabunda* (Gravenhorst, 1829)
 - *genalis* (Thomson, 1877)
 - *quadrilineata* (Gravenhorst, 1829)
- Lissonota* Gravenhorst, 1829**
 - Ichneumon setosus* Geoffroy, 1785
 - Lissonota* (*Lissonota*) (Gravenhorst, 1829)
 - Lampronota* Curtis, 1832
 - Meniscus* Schiødte, 1839
- *accusator* (Fabricius, 1793)
- *admontensis* (Strobl, 1902)
- *albicoxis* Kriechbaumer, 1888
- *alpinistor* (Aubert, 1978)
- *alpivagator* Aubert, 1976
- *amabilis* (Habermehl, 1918)
- *antennalis* Thomson, 1877
- *argiola* Gravenhorst, 1829
- *atropos* Schmiedeknecht, 1900
- *barbator* Aubert, 1972
- *bicincta* (Szépligeti, 1899)
- *biguttata* (Holmgren, 1860)
- *bilineata* Gravenhorst, 1829
- *bistrigata* (Holmgren, 1860)
- *bivittata* Gravenhorst, 1829
- *breviventris* Hellén, 1915
- *buccator* (Thunberg, 1822)
- *buolianae* Hartig, 1838
- *carbonaria* Holmgren, 1860
- *complicator* Aubert, 1967
- *clypealis* Thomson, 1887
- *clypeator* (Gravenhorst, 1829)
- *complicator* Aubert, 1967
- *conflagrata* Gravenhorst, 1829
- *coracina* (Gmelin, 1790)
- *culiciformis* Gravenhorst, 1829
- *deversor* Gravenhorst, 1829
- *distincta* (Bridgman, 1889)
- *dubia* Holmgren, 1856
- *exelsa* Schmiedeknecht, 1900
- *extrema* Hedwig, 1932
- *fletcheri* Bridgman, 1882
- *folii* Thomson, 1877
- *freyi* Hellén, 1915
- *frontalis* (Desvignes, 1856)
- *fundator* (Thunberg, 1822)
- *gracilenta* (Holmgren, 1860)
- *gracilipes* (Thomson, 1877)
- *hortorum* Gravenhorst, 1829
- *humarella* Thomson, 1877
- *impressor* Gravenhorst, 1829
- *inareolata* Pfeffer, 1913
- *lineolaris* Gmelin, 1790
- *lissonotator* Aubert, 1977
- *maculata* Brischke, 1865
- *magdalenae* Pfankuch, 1921

- *manca* (Brauns, 1896)
- *monosticta* Kriechbaumer, 1900
- *mutator* Aubert, 1969
- *nigra* Brischke, 1880
- *nigridens* Thomson, 1889
- *nitida* (Gravenhorst, 1829)
- *obscuripes* (Strobl, 1902)
- *palpalis* (Thomson, 1889)
- *pectinator* Aubert, 1972
- *picticoxis* Schmiedeknecht, 1900
- *pimplator* (Zetterstedt, 1838)
- *pleuralis* (Brischke, 1880)
- *proxima* (Fonscolombe, 1854)
- *punctiventror* Aubert, 1977
- *punctiventris* Thomson, 1877
- *quadrinotata* Gravenhorst, 1829
- *rubricoxa* Brischke, 1880
- *saturator* (Thunberg, 1822)
- *setosa* (Geoffroy, 1785)
- *silvatica* Habermehl, 1918
- *stigmator* Aubert, 1972
- *subaciculata* (Bridgman, 1886)
- *superbator* Aubert, 1967
- *tenerrima* Thomson, 1877
- *thuringiaca* (Schmiedeknecht, 1900)
- *transversostriatas* (Sm. v. Burgst, 1921)
- *tristis* Brischke, 1888
- *unicincta* (Holmgren, 1860)
- *ulbrichtii* (Ulbricht, 1909)
- *variabilis* (Holmgren, 1860)
- Lissonota (Loxonota)* Aubert, 1993
 - Lissonota parallela* Gravenhoorst, 1829
 - *cruentator* (Panzer, 1809)
 - *histrio* (Fabricius, 1798)
 - *lineata* Gravenhoorst, 1829
 - *polonica* (Habermehl, 1918)
- Syzeuctus* Foerster, 1869
 - Diceratops* Foerster, 1869
 - *Syzeuct* Thomson, 1889
 - *irrisorius* (Rossi, 1794)
 - *maculipennis* Costa, 1883
- Banchini* Wesmael, 1845
- Banchus* Fabricius, 1798
 - Cidaphurus* Foerster, 1869
 - *dilatatorius* (Thunberg, 1822)
- *falcatorius* (Fabricius, 1775)
- *hastator* (Fabricius, 1793)
- *pictus* (Fabricius, 1798)
- *volutatorius* (Linnaeus, 1758)
 - Ichneumon volutatorius* Linnaeus, 1758
- Exetastes* (Gravenhorst, 1829)
 - Ichneumon fornicator* Fabricius, 1791
- *adpressorius* (Thunberg, 1822)
 - Ichneumon adpressorius* Thunberg, 1822
- *albiger* Kriechbaumer, 1886
- *albomaculatus* Meyer, 1921
- *atrator* (Foerster, 1871)
- *calobatus* Gravenhorst, 1829
- *crassus* (Gravenhorst, 1829)
- *femorator* (Desvignes, 1856)
 - Banchus femorator* Desvignes, 1856
- *fornicator* (Fabricius, 1781)
- *geniculosus* Holmgren, 1860
- *gracilicornis* (Gravenhorst, 1829)
- *ichneumoniformis* (Gravenhorst, 1829)
- *illusor* (Gravenhorst, 1829)
- *inquisitor* (Gravenhorst, 1829)
- *laevigator* (Villers, 1789)
- *minor* Szépligeti, 1901
- *nigripes* Gravenhorst, 1829
- *notatus* Holmgren, 1860
- *robustus* Gravenhorst, 1829
- *rufipes* (Gmelin, 1790)
- *tibialis* Pfankuch, 1921
- *tomentosus* (Gravenhorst, 1829)
 - Banchus tomentosus* Gravenhorst, 1829
- Glyptini* Cushman & Rohwer, 1920
- Apophua* Morley, 1913
- *bipunctoria* (Thunberg, 1822)
- *cicatricosa* (Ratzeburg, 1848)
- Cephaloglypta* Obertel, 1956
- *excavata* (Obertel, 1956)
 - Cephaloglypta rubiginosus* Gmelin, 1790
- *murinanae* (Bauer, 1958)
- Glypta* (Gravenhorst, 1829)
 - Conoblasta* Foerster, 1869
 - *bifoveolata* Gravenhorst, 1829
 - *caudata* Thomson, 1889
 - *ceratites* Gravenhorst, 1829
 - *consimilis* (Holmgren, 1860)

- *cylindrator* (Fabricius, 1787)
- *elongata* Holmgren, 1860
- *exophthalmus* (Kriechbaumer, 1887)
- *extincta* (Ratzeburg, 1852)
- *femorator* (Desvignes, 1856)
- *fronticornis* Gravenhorst, 1829
- *haesitator* (Gravenhorst, 1829)
- *incisa* Gravenhorst, 1829
- *lapponica* (Holmgren, 1860)
- *longicauda* (Hartig, 1838)
- *longispinis* (Gmelin, 1790)
- *mensurator* (Fabricius, 1775)
- *monoceros* Gravenhorst, 1829
- *nigricornis* (Thomson, 1889)
- *nigrina* (Desvignes, 1856)
 - Glypta flavipes* Desvignes, 1856
- *nigriventris* (Thomson, 1873)
- *pedata* (Desvignes, 1856)
- *resinanae* (Hartig, 1838)
- *rufata* Bridgman, 1887
- *rufiscutellaris* (Cresson, 1870)
- *salsolicola* Schmiedeknecht, 1907
- *scalaris* (Gravenhorst, 1829)
- *sculpturata* (Gravenhorst, 1829)
- *scutellaris* Thomson, 1889
- *tenuicornis* (Thomson, 1889)
- *teres* Gravenhorst, 1829
- *vulnerator* (Gravenhorst, 1829)
- Teleutaea* (Foerster, 1869)
- *brischkei* (Holmgren, 1860)
 - Glypta brischkei* Holmgren, 1860
- *striata* (Gravenhorst, 1829)
 - Lissonota striata* Gravenhorst, 1829
- Brachycyrtinae Viereck, 1919⁸**
- Brachycyrtus** Kriechbaumer, 1880
 - Proterocryptus* Ashmead, 1906
- *ornatus* Kriechbaumer, 1880
- Campopleginae Foerster, 1869**
- Alcima** Foerster, 1869
- *orbitale* (Gravenhorst, 1829)
- Bathyplectes** (Foerster, 1869)
 - Campoplex exiguum* Gravenhorst, 1829
- *anurus* (Thomson, 1887)
 - Canidia anura* Thomson, 1887
- *balteatus* Thomson, 1887
- *brevitor* Aubert, 1974
- *carinatus* Horstmann, 1974
- *cingulatus* (Brischke, 1880)
- *curculionis* (Thomson, 1887)
- *exiguus* (Gravenhorst, 1829)
- *immolator* (Gravenhorst, 1829)
- *infernalis* (Gravenhorst, 1820)
- *incisus* Horstmann, 1974
- *quinqueangularis* (Ratzeburg, 1852)
- *rostratus* (Thomson, 1887)
- *rufipes* Horstmann, 1974
- *stenostigma* (Thomson, 1887)
 - Canidia stenostigma* Thomson, 1887
- *xanthostigma* (Szépligeti, 1901)
- Benjaminia** (Viereck, 1912)
 - Zachrestoides* Viereck, 1925
- *polonica* Sawoniewicz, 1973
- Callidora** Foerster, 1869
 - Pantropa* Foerster, 1869
- *albovincta* (Holmgren, 1860)
 - Limneria albovincta* Holmgren, 1860
- *analis* (Gravenhorst, 1829)
- Campoletis** (Foerster, 1869)
 - Anilastus* Foerster, 1869
 - Ecphora* Foerster, 1869
- *agilis* (Holmgren, 1860)
- *annulata* (Gravenhorst, 1829)
- *cognata* (Tschek, 1871)
- *congesta* (Holmgren, 1860)
- *crassicornis* (Tschek, 1871)
- *dilator* (Thunberg, 1822)
- *erythropus* (Thomson, 1887)
- *fasciata* (Bridgman, 1887)
- *femoralis* (Gravenhorst, 1829)
- *holmgreni* (Tschek, 1871)
- *mitis* (Holmgren, 1860)
- *varians* (Thomson, 1887)
- *viennensis* (Gravenhorst, 1829)
- *zonata* (Gravenhorst, 1829)
- Campoplex** (Gravenhorst, 1829)
 - Dioratica* Foerster, 1869
 - Omorgus* Foerster, 1869
- *abbreviatus* (Brischke, 1880)
- *alticolellae* Horstmann, 1980
- *angulatus* (Thomson, 1887)
- *angustator* (Zetterstedt, 1838)

- *angustioranae* (Bauer, 1937)
 - *anomolus* (Gravenhorst, 1829)
 - *borealis* (Zetterstedt, 1838)
 - *cingulatus* (Brischke, 1880)
 - *continuus* (Thomson, 1887)
 - *coracinus* (Thomson, 1887)
 - *cursitans* (Holmgren, 1860)
 - *diformis* (Gmelin, 1790)
 - *discrepans* (Pfankuch, 1914)
 - *dubitator* Horstmann, 1985
 - *faunus* (Gravenhorst, 1829)
 - *ferinus* (Holmgren, 1860)
 - Limneria ferina* Holmgren, 1860
 - *fusciplica* Thomson, 1887
 - *fusicornis* (Thomson, 1887)
 - *gastroides* Gravenhorst, 1829
 - *gracillimus* (Dalla Torre, 1901)
 - *hadrocerus* (Thomson, 1887)
 - *hinziator* Aubert, 1980
 - *infestus* (Foerster, 1871)
 - *instigator* (Habermehl, 1915)
 - *investigator* (Habermehl, 1923)
 - *jaeckhi* (Bauer, 1936)
 - *liogaster* (Thomson, 1887)
 - *lugubrinus* (Holmgren, 1860)
 - *lyratus* (Thomson, 1887)
 - *maculifemur* (Strobl, 1901)
 - *melanostictus* Gravenhorst, 1829
 - *minor* Horstmann, 1985
 - *multicinctus* Gravenhorst, 1829
 - *nigricanae* Horstmann, 1980
 - *occipitor* Aubert, 1966
 - *ovatus* (Brischke, 1880)
 - *punctipleuris* (Horstmann, 1980)
 - *ramidulus* (Brischke, 1880)
 - *rector* Aubert, 1972
 - *restrictor* Aubert, 1960
 - *rothii* (Holmgren, 1860)
 - *rufinator* (Aubert, 1971)
 - *rufocinctus* (Horstmann, 1985)
 - *satanator* Aubert, 1966
 - *solitarius* (Brischke, 1880)
 - *spurius* Gravenhorst, 1829
 - *sulcatus* Horstmann, 1985
 - *tumidulus* Gravenhorst, 1829
 - *unicingulatus* Schmiedeknecht, 1909
- Casinaria* Holmgren, 1859
Campotrephus Foerster, 1869
- *affinis* Tschech, 1871
 - *albipalpis* (Gravenhorst, 1829)
 - Campoplex albipalpis* Gravenhorst, 1829
 - *carinata* Kriechbaumer, 1898
 - *mesozosta* (Gravenhorst, 1829)
 - *moesta* (Gravenhorst, 1829)
 - *morianella* Holmgren, 1860
 - *nigripes* (Gravenhorst, 1829)
 - Campoplex nigripes* Gravenhorst, 1829
 - *pallipes* (Brischke, 1880)
 - *scabra* Thomson, 1887
 - *stygia* Tschech, 1871
 - *tenuiventris* (Gravenhorst, 1829)
- Charops* Holmgren, 1859
Zacharops Viereck, 1912
- *cantator* (De Geer, 1778)
 - Ichneumon cantator* De Geer, 1778
- Cymodusa* (*Cymodusa*) Holmgren, 1859
- *antennator* (Holmgren, 1860)
 - *australis* (Smits van Burgst, 1913)
 - *cruentata* (Gravenhorst, 1829)
 - Campoplex cruentatus* Gravenhorst, 1829
 - *declinator* (Gravenhorst, 1829)
 - *exilis* (Holmgren, 1860)
 - *jaceki* Sawoniewicz, 1978
 - *leucocera* (Holmgren, 1859)
 - *longiterebra* Dbar, 1985
- Diadegma* Foerster, 1869
Angitia Holmgren, 1859
- *albotibiale* (Horstmann, 1973)
 - *angitiaeforma* (Horstmann, 1973)
 - *annulicrus* (Thomson, 1887)
 - *anura* (Thomson, 1887)
 - *areolaris* (Holmgren, 1860)
 - *armillatum* (Gravenhorst, 1829)
 - *balticum* Horstmann, 1973
 - *brevivalve* (Thomson, 1887)
 - *cerophaga* (Gravenhorst, 1829)
 - *chrysostictos* (Gmelin, 1790)
 - *claripenne* (Thomson, 1887)
 - *coleophorarum* (Ratzeburg, 1852)
 - *combinatum* (Holmgren, 1860)
 - *consumptor* (Gravenhorst, 1829)
 - *crassicornie* (Gravenhorst, 1829)
 - Campoplex crassicornis* Gravenhorst, 1829

- *crassiseta* (Thomson, 1887)
- *crassum* (Bridgman, 1889)
- *cylindricum* (Brischke, 1880)
- *dinianator* Aubert, 1966
- *duplicatum* (Horstmann, 1980)
- *elischae* (Bridgman, 1884)
Limneria elischae Bridgman, 1884
- *elongata* (Thomson, 1887)
- *erraticum* (Brischke, 1880)
- *erucator* (Zetterstedt, 1838)
- *fenestrale* (Holmgren, 1860)
- *flavotibiale* (Horstmann, 1973)
- *flexum* (Horstmann, 1973)
- *fumatum* (Hedwig, 1962)
- *gallicator* (Aubert, 1960)
- *glabriculum* (Holmgren, 1859)
- *gracile* (Gravenhorst, 1829)
- *gracillimum* (Smits van Burgst, 1914)
- *grisescens* (Gravenhorst, 1829)
- *holopygum* (Thomson, 1887)
- *hygrobium* (Thomson, 1887)
- *incompletum* (Horstmann, 1973)
- *kyffhusanae* (Horstmann, 1973)
- *laricinellum* (Strobl, 1904)
- *laterale* (Gravenhorst, 1829)
- *ledicola* (Horstmann, 1973)
- *lithocolletis* (Horstmann, 1973)
- *litoralis* (Holmgren, 1856)
- *longicaudatum* (Horstmann, 1973)
- *maculatum* (Gravenhorst, 1829)
- *majale* (Gravenhorst, 1829)
- *major* (Szépligeti, 1916)
- *melanium* (Thomson, 1887)
- *meliloti* (Horstmann, 1973)
- *micrurum* (Thomson, 1887)
- *nanus* (Gravenhorst, 1829)
- *neocerophagum* (Horstmann, 1973)
- *neomajale* (Horstmann, 1973)
- *nervosae* (Horstmann, 1973)
- *nigrostigmaticum* Horstmann, 1973
- *paludis* Horstmann, 1973
- *pusio* (Horstmann, 1860)
- *rectificator* (Aubert, 1970)
- *rufata* (Bridgman, 1884)
- *ruficeps* (Holmgren, 1860)
- *rufigaster* (Horstmann, 1973)
- *salicis* Horstmann, 1973
- *semiclausum* (Hellén, 1849)
- *specularis* (Thomson, 1887)
- *stagnalis* (Holmgren, 1856)
- *stigmatellae* Horstmann, 1980
- *tenuipes* (Thomson, 1887)
- *transversale* (Szépligeti, 1916)
- *tripunctata* (Bridgman, 1886)
- *trochanteratum* (Thomson, 1887)
- *truncatum* (Thomson, 1887)
- *variegatum* (Szépligeti, 1916)
- *velox* (Holmgren, 1860)
- *villosulum* (Hedwig, 1962)
- Dolophron* Foerster, 1969
Limneria pedella Holmgren, 1860
- *pedella* (Holmgren, 1860)
- Dusona* Cameron, 1901
Delopia Cameron, 1903
- *aemula* (Foerster, 1868)
- *alticola* (Gravenhorst, 1829)
- *americana* (Ashmead, 1890)
- *anceps* (Holmgren, 1860)
- *angustata* (Thomson, 1887)
- *angustifrons* (Foerster, 1868)
- *aurita* (Kriechbaumer, 1883)
- *bellipes* (Holmgren, 1872)
- *baueri* Hinz, 1973
- *bucculenta* (Holmgren, 1860)
- *cairnifrons* (Holmgren, 1860)
- *carpathica* (Szépligeti, 1916)
Casinaria carpathica Szépligeti, 1916
- *circumcinctus* (Foerster, 1868)
- *circumspectans* (Foerster, 1868)
- *confusa* (Foerster, 1868)
- *contumax* (Foerster, 1868)
- *culturator* (Gravenhorst, 1829)
Campoplex culturator Gravenhorst, 1829
- *disclusa* (Foerster, 1868)
- *dubitator* Hinz, 1977
- *erythrogaster* (Foerster, 1868)
- *falcator* (Fabricius, 1775)
- *foerster* (Roman, 1942)
- *genalis* (Thomson, 1887)
- *habermehli* (Kriechbaumer, 1898)
- *heterocera* (Foerster, 1868)

- *inermis* (Foerster, 1868)
- *insignis* (Foerster, 1868)
- *infesta* (Foerster, 1868)
- *inermis* (Foerster, 1868)
- *juvenilis* (Foerster, 1868)
- *leptogaster* (Holmgren, 1860)
- *libertatis* (Teunissen, 1947)
- *limnobia* (Thomson, 1887)
- *mactator* (Foerster, 1868)
- *montana* (Roman, 1929)
- *myrtilla* (Desvignes, 1856)
- *multicinctus* (Gravenhorst, 1829)
- *nidulator* (Fabricius, 1804)
- *obliterata* (Holmgren, 1872)
- *opaca* (Thomson, 1887)
- *oxyacanthe* (Boie, 1855)
- *perditor* (Foerster, 1868)
- *peregrina* (Wollaston, 1858)
- *petiolator* (Fabricius, 1804)
- *pineticala* (Holmgren, 1872)
- *polita* (Foerster, 1868)
- *pugillator* (Linnaeus, 1758)
 - Campoplex pugillator* Linnaeus, 1758
- *recta* (Thomson, 1887)
- *remota* (Foerster, 1868)
- *rugifer* (Foerster, 1868)
- *rugulosa* (Foerster, 1868)
- *sobolicida* (Foerster, 1868)
- *spinipes* (Thomson, 1887)
 - Campoplex spinipes* Thomson, 1887
- *stenocara* (Thomson, 1887)
- *stenogaster* (Foerster, 1868)
- *stragifex* (Foerster, 1868)
- *subaequalis* (Foerster, 1868)
- *subcinctus* (Foerster, 1868)
- *subimpressa* (Foerster, 1868)
- *tenuis* (Foerster, 1868)
- *terebrator* (Foerster, 1868)
- *thomsoni* Hinz, 1963
- *vidua* (Gravenhorst, 1829)
- *vigillator* (Foerster, 1868)
- *xenocampa* (Foerster, 1868)
- Echthronomas* Foerster, 1869
 - Casinaria ochrostoma* Holmgren, 1860
 - *ochrostoma* (Holmgren, 1860)
 - *quadrinotata* (Thomson, 1887)
- *tricincta* (Gravenhorst, 1829)
 - Campoplex tricinctus* Gravenhorst, 1829
- Enythus* Cameron, 1905
 - Enythus maculipes* Cameron, 1903
- *apostatus* (Gravenhorst, 1829)
- *appositor* (Aubert, 1970)
- *crataegellae* (Thomson, 1887)
 - Angitia crataegellae* Thomson, 1887
- *montanus* (Ashmead, 1890)
- *neoapostatus* (Horstmann, 1869)
- Eriborus* Foerster, 1869
 - Zaporus* Foerster, 1869
- *braccatus* (Gmelin, 1790)
- *dorsalis* (Gravenhorst, 1829)
- *obscuripes* Horstmann, 1987
- *obscurus* Horstmann, 1987
- *perfidus* (Gravenhorst, 1829)
- *rufopictus* Horstmann, 1987
- *terebrans* (Gravenhorst, 1829)
- Gonotypus* Foerster, 1869
 - Gonotypha melanostoma* Thomson, 1887
 - *melanostoma* (Thomson, 1887)
- Hellwigia* Gravenhorst, 1823
 - *elegans* Gravenhorst, 1823
 - *obscura* (Gravenhorst, 1829)
- Hyposoter* (Hyposoter) Foerster, 1869
 - Ameloctonus* Foerster, 1869
 - *albicans* (Brischke, 1880)
 - *berberatae* Habermehl, 1922
 - *caedator* (Gravenhorst, 1829)
 - *carbonarius* (Ratzeburg, 1844)
 - Campoplex carbonarius* Ratzeburg, 1844
 - *didymator* (Thunberg, 1822)
 - *discedens* (Schmiedeknecht, 1909)
 - *dolosus* (Gravenhorst, 1829)
 - *ebenina* (Gravenhorst, 1829)
 - *horticola* (Gravenhorst, 1829)
 - *maculatus* (Hedwig, 1938)
 - *nigrior* Aubert, 1993
 - *notatus* (Gravenhorst, 1829)
 - *obscurellus* (Holgren, 1860)
 - *pectinatus* (Thomson, 1887)
 - *sicarius* (Gravenhorst, 1829)
 - *thuringiacus* (Schmiedeknecht, 1909)
 - *tibialis* Hedwig, 1938
 - *tricolor* (Ratzeburg, 1844)
 - Campoplex tricolor* Ratzeburg, 1844

- *tricoloripes* (Viereck, 1911)
- *validus* (Pfankuch, 1921)
 - Anilastus validus* Pfankuch, 1921
- Lathroplex* Foerster, 1869
- *clypearis* (Thomson, 1887)
- Lathrostizus* Foerster, 1869
- *curvicauda* (Holmgren, 1860)
- *flexicauda* (Holmgren, 1860)
- *lugens* (Gravenhorst, 1829)
- *macrostoma* (Thomson, 1887)
- Lemophagus* Townes, 1970
- *curtus* Townes, 1966
- Leptocampoplex* Horstmann, 1970
- *punctulatus* (Ratzeburg, 1848)
 - Nemeriti scremastooides* Holmgren, 1860
- Macrus* Gravenhorst, 1829
- *filiventris* (Gravenhorst, 1829)
- *parvulus* (Gravenhorst, 1829)
 - Campoplex parvulus* Gravenhorst, 1829
- Meloboris* Holmgren, 1859
 - Asinamora* Foerster, 1869
 - Nepiera* Foerster, 1869
 - *alternans* (Gravenhorst, 1829)
 - *collector* (Thunberg, 1822)
 - *gracilis* Holmgren, 1859
 - Limneria monticolana* Bridgman, 1881
 - *proxima* (Perkins, 1942)
- Nemeritis* Holmgren, 1860
 - Campoplex macrocentrus* Gravenhorst, 1829
 - *aequalis* Horstmann, 1973
 - *arianensis* (Smits van Burgst, 1913)
 - *brevicauda* Horstmann, 1975
 - *breviventris* Horstmann, 1975
 - *caudata* (Szépligeti, 1916)
 - *caudatula* Thomson, 1887
 - *cingulata* Horstmann, 1973
 - *elegans* (Szépligeti, 1901)
 - *fallax* (Gravenhorst, 1829)
 - *lativentris* Thomson, 1887
 - *lissonotoides* Schmiedeknecht, 1909
 - *macrocentra* (Gravenhorst, 1829)
 - *major* (Szépligeti, 1916)
 - *obscuripes* Horstmann, 1975
 - *scaposa* Horstmann, 1975
 - *silvicola* Horstmann, 1973
- *specularis* Horstmann, 1975
- Nepiesta* Foerster, 1869
- *hungarica* Szépligeti, 1916
- *mandibularis* Holmgren, 1860
- *tricingulata* Horstmann, 1973
- Olesicampe* Foerster, 1869
- *alboplica* (Thomson, 1887)
- *annulitarsis* (Thomson, 1887)
- *argentata* (Gravenhorst, 1829)
- *auctor* (Gravenhorst, 1829)
- *macellator* (Thunberg, 1822)
- *binotata* (Thomson, 1887)
- *canaliculata* (Gravenhorst, 1829)
- *cavigena* (Thomson, 1887)
- *curtigena* (Thomson, 1887)
 - Holocremna curtigaena* Thomson, 1887
- *errabunda* (Gravenhorst, 1829)
- *femorella* (Thomson, 1887)
- *forticostata* (Schmiedeknecht, 1909)
- *fulcrans* Thomson, 1887
- *gracilipes* (Thomson, 1887)
- *heterogaster* (Thomson, 1887)
- *longipes* (Müller, 1776)
- *macellator* (Thunberg, 1822)
- *melanogaster* (Thomson, 1887)
- *monticola* (Hedwig, 1938)
- *nigroplica* (Thomson, 1887)
- *patellana* Thomson, 1887
- *punctitarsis* (Thomson, 1887)
- *ratzeburgi* (Tschech, 1871)
- *retusa* (Thomson, 1887)
- *ruficornis* (Pfankuch, 1921)
 - Holocremnus ruficornis* Pfankuch, 1921
- *senicula* Schmiedeknecht, 1933
- *signata* (Brischke, 1880)
- *spiraea* (Thomson, 1887)
- *tarsatoor* (Thomson, 1887)
- *terebrator* Hinz, 1975)
- Phaedroctonus* Foerster, 1869
 - Porizon* Fallén, 1813
- *albistriae* Horstmann, 1987
- *moderator* (Linnaeus, 1758)
- *transfuga* (Gravenhorst, 1829)
- Phobocampe* Foerster, 1869
 - Campoplex crassiuscula* Gravenhorst, 1829
- *alticollis* Thomson, 1887

- *bicingulata* (Gravenhorst, 1829)
 - *confusa* Thomson, 1887
 - *crassiuscula* (Gravenhorst, 1829)
 - *croceipes* (Marshall, 1876)
 - *flavicincta* Thomson, 1887
 - *luctuosa* Schmiedeknecht, 1909
 - *lymantriae* Gupta, 1983
 - *neglecta* (Holmgren, 1860)
 - *pulchella* (Thomson, 1887)
 - *pullata* Ulbricht, 1910
 - *unicincta* (Gravenhorst, 1829)
 - Pyracmon* Foerster, 1859
 - Porizon fumipennis* Zetterstedt, 1838
 - *brevicauda* (Horstmann, 1987)
 - *carbonellsm* (Thomson, 1887)
 - *fumipennis* (Zetterstedt, 1838)
 - *sepiellus* (Holmgren, 1860)
 - Rhimphoctona* (*Rhimphoctona*) Foerster, 1869
 - *grandis* (Fonscolombe, 1852)
 - Phytodietus grandis* Fonscolombe, 1852
 - Rhimphoctona* (*Xylophylax*) Kriechbaumer, 1878
 - Parapyracmon* Clément, 1924
 - *longicauda* Horstmann, 1980
 - *lucida* (Clément, 1924)
 - *malator* Aubert, 1986
 - *megacephala* (Gravenhorst, 1829)
 - *melanura* (Holmgren, 1860)
 - *obscuripes* (Holmgren, 1860)
 - *pectoraliss* (Kriechbaumer, 1890)
 - *rufocoxalis* (Clément, 1924)
 - *xoridiformis* (Holmgren, 1860)
 - Sinophorus* Foerster, 1869
 - Eulinmneria* Schmiedeknecht, 1907
 - *albidus* (Gmelin, 1790)
 - Ichneumon albidus* Gmelin, 1790
 - *crassifemur* (Thomson, 1887)
 - Limneria crassifemur* Thomson, 1887
 - *fuscicarpus* (Thomson, 1887)
 - Limneria fuscicarpus* Thomson, 1887
 - *geniculatus* (Gravenhorst, 1829)
 - Campoplex geniculatus* Gravenhorst, 1829
 - *juniperiusa* (Holmgren, 1856)
 - *turionum* (Ratzeburg, 1844)
 - *xanthostomus* (Gravenhorst, 1829)
 - Tranosema* Foerster, 1869
 - Tranosema arenicola* Thomson, 1887
 - *exoletum* (Thomson, 1887)
 - *hyperboreum* (Thomson, 1887)
 - *latiusculum* Thomson, 1887
 - *nigridens* (Thomson, 1887)
 - *nishiguschi* (Momoi, 1965)
 - *rostralis* (Brischke, 1880)
 - Tranosemella* Horstmann, 1978
 - Limneria interrupta* Holmgren, 1858
 - *completa* (Horstmann, 1973)
 - *praerogator* (Linnaeus, 1758)
 - Ichneumon chrysogaster*, Gmelin, 1790
- Collyriinae* Cushman, 1924
- Collyria* Schiodte, 1839
 - Pachymerus* Gravenhorst, 1829
 - *coxator* (Villers, 1789)
 - *trichophthalma* (Thomson, 1877)
- Cremastinae* Foerster, 1869
- Cremastus* (Gravenhorst, 1829)
 - Zaleptopygus* Viereck, 1911
 - *bellicosus* (Gravenhorst, 1829)
 - *crassicornis* (Thomson, 1890)
 - *geminus* (Gravenhorst, 1829)
 - *gigas* Heinrich, 1953
 - *infirmitus* (Gravenhorst, 1829)
 - *inflatipes* Roman, 1939
 - *kratochvili* Šedivy, 1970
 - *puberulus* Szépligeti, 1899
 - *pungens* (Gravenhorst, 1829)
 - *spectator* (Gravenhorst, 1829)
 - Dimophora* Foerster, 1869
 - Oligotmema* Cushman, 1920
 - *evanialis* (Gravenhorst, 1829)
 - *nitens* (Gravenhorst, 1829)
 - Pristomerus* Curtis, 1836
 - Ichneumon vulnerator* Panzer, 1799
 - *armatus* (Lucas, 1949)
 - *genalis* Sawoniewicz, 1978
 - *horribilis* Narolsky, 1987
 - *kasparyani* Narolsky, 1986
 - *orbitalis* Holmgren, 1860
 - *vulnerator* (Panzer, 1799)
 - Temelucha* Foerster, 1869
 - Paracremastus* Szépligeti, 1899
 - *albipennis* (Zetterstedt, 1938)

- *annulata* (Szépligeti, 1899)
 - *discoidalis* (Szépligeti, 1899)
 - *genalis* (Szépligeti, 1899)
 - *guttifer* (Thomson, 1890)
 - *interruptor* (Gravenhorst, 1829)
 - *schoenobia* (Thomson, 1890)
 - *signata* (Holmgren, 1860)
 - *subnasuta* (Thomson, 1890)
- Cryptinae Kirby, 1837⁷**
- Cryptini Kirby, 1837**
- Acroricnus Ratzeburg, 1852**
- Acroricnus schaumii* Ratzeburg, 1852
 - *seductor* (Scopoli, 1786)
 - Ichneumon seductor* Scopoli, 1786
 - Ichneumon seductorius* Fabricius 1793
 - *stylator* (Thunberg, 1822)
 - Ichneumon stylator* Thunberg, 1822
 - Cryptus macrobatus* Gravenhorst, 1829
- Agrothereutes Foerster, 1850**
- Ichneumon abbreviatus* Fabricius, 1794
 - Spilocryptus* Thomson, 1873
 - *abbreviatus* (Fabricius, 1794)
 - Ichneumon brevior* Thunberg, 1822
 - Pezomachus hopei* Gravenhorst, 1829
 - *adustus* (Gravenhorst, 1829)
 - *albovinctus* (Gravenhorst, 1829)
 - *aterrimus* (Gravenhorst, 1829)
 - *aterrimus* (Gravenhorst, 1829)
 - Cryptus aterrimus* Gravenhorst, 1829
 - Cryptus aterrimus* Gravenhorst, 1829
 - *brachysoma* (Taschenberg, 1865)
 - *fumipennis* (Gravenhorst, 1829)
 - Cryptus fumipennis* Gravenhorst, 1829
 - Spilocryptus gracilentus* Habermehl, 1929
 - *hospes* (Tschech, 1871)
 - *mandator* (Linnaeus, 1758)
 - *parvulus* (Habermehl, 1926)
 - *pygmaeus* (Habermehl, 1919)
 - *saturniae* (Boie, 1855)
- Apsilops Foerster, 1869**
- Dapanus* Foerster, 1869
 - Trichocryptus* Thomson, 1873
 - *aquaticus* (Thomson, 1874)
 - *cinctorius* (Fabricius, 1775)
 - Phygadeuon spinosus* Rudow, 1886
- Aritranis Foerster, 1869**
- Cryptus explorator* Tschech, 1871
 - *buccata* (Tschech, 1872)
 - *confector* (Gravenhorst, 1829)
 - *coxator* (Tschech, 1871)
 - *explorator* (Tschech, 1871)
 - *femoralis* (Gravenhorst, 1829)
 - *fugitiva* (Gravenhorst, 1829)
 - *heliophila* (Tschech, 1871)
 - *insectator* (Tschech, 1871)
 - *melanocephala* (Gravenhorst, 1829)
 - *occisor* (Gravahorst, 1829)
 - *quadriguttatus* (Gravenhorst, 1829)
- Ateleute Foerster, 1869**
- *linearis* Foerster, 1871
- Buathra Cameron, 1903**
- Buathra rufiventris* Cameron, 1903
 - Bathycrisis* Cameron, 1905
 - *divisoria* (Tschech, 1872)
 - *laborator* (Thunberg, 1822)
 - *tarsoleucus* (Schrank, 1781)
- Caenocryptus Thomson, 1873**
- Cryptus rufiventris* Gravenhorst, 1829
 - *polytomi* (Tschech, 1872)
 - *rufiventris* (Gravenhorst, 1829)
 - Cryptus eborinus* Ratzeburg, 1852
- Cryptus Fabricius, 1804**
- Eucryptus* Haldeman, 1842
 - Itamoplex* Foerster, 1869
 - Plesiocryptus* Cameron, 1903
 - *apparitorius* (Villers, 1789)
 - Ichneumon pungens* Gravenhorst, 1829
 - *aridus* Pratt, 1945
 - *armator* Fabricius, 1804
 - Ichneumon albatorius* Villers, 1789
 - *inculcator* (Linnaeus, 1758)
 - Ichneumon sponsor* Fabricius, 1793
 - *leucocheir* (Ratzeburg, 1844)
 - *lugubris* Gravenhorst, 1829
 - *minator* Gravenhorst, 1829
 - *spinosus* Gravenhorst, 1829
 - *spiralis* (Geoffroy, 1785)
 - Ichneumon incospicuus* Gravenhorst, 1829
 - *szulczewskii* Torka, 1939
 - *viduatorius* (Fabricius, 1804)
 - Enclisis* Townes, 1970
 - Cryptus macilentus* Gravenhorst, 1829
 - *alpicola* (Habermehl, 1926)

- *macilenta* (Gravenhorst, 1829)
- *ornaticeps* (Thomson, 1885)
- *vindex* (Tschech, 1871)
 - Caenocryptus pubiventris* Thomson, 1873
- Gambrus* Foerster, 1869
 - Kaltenbachia* Foerster, 1869
 - Hygrocryptus* Thomson, 1873
 - *amoenus* (Gravenhorst, 1829)
 - *carnifex* (Gravenhorst, 1829)
 - Cryptus carnifex* Gravenhorst, 1829
 - *conjugens* (Tschech, 1871)
 - *incertus* Habermehl, 1935
 - *incubitor* (Linnaeus, 1758)
 - *leucoproctus* (Gravenhorst, 1829)
 - *ornatulus* (Thomson, 1873)
 - *ornatus* (Gravenhorst, 1829)
- Hidryta* Foerster, 1869
 - Brachycryptus* Thomson, 1873
 - *frater* (Cresson, 1864)
 - *fusiventralis* (Thomson, 1873)
- Idiolispia* Foerster, 1869
 - Liocryptus* Thomson, 1873
 - *analis* (Gravenhorst, 1807)
 - Bassus analis* Gravenhorst, 1807
 - *hungarica* (Szépligeti, 1916)
 - *striata* Schwarz, 1988
- Ischnus* Gravenhorst, 1829
 - Habrocyptus* Thomson, 1873
 - *agitator* (Olivier, 1792)
 - *alternator* (Gravenhorst, 1829)
 - *collaris* (Tschech, 1872)
 - *inquisitorius* (Müller, 1776)
 - Ichneumon inquisitorius* Müller, 1776
 - *insulanus* (Krieger, 1897)
 - *migrator* (Fabricius, 1775)
 - *punctiger* (Thomson, 1896)
- Listrognathus* Tschech, 1871
 - Listrognathus cornutus* Tschech, 1871
 - Listrognathus* (*Listrognathus*) Tschech, 1871
 - Mesostenoideus* Ashmead, 1900
 - *compressicornis* (Gravenhorst, 1829)
 - *ligator* (Gravenhorst, 1829)
 - *mactator* (Thunberg, 1822)
 - *mengersseni* Schmiedeknecht, 1905
 - *obnoxius* (Gravenhorst, 1829)
 - *pubescens* (Fonscolombe, 1850)
- Meringopus* Foerster, 1869
 - Gonioctryptus* Thomson, 1873
- *calescens* (Gravenhorst, 1829)
- *cyanator* (Gravenhorst, 1829)
- *sogdianus* (Maljavin, 1968)
- *titillator* (Linnaeus, 1758)
- Mesostenus* (Gravenhorst, 1829)
 - Stenaraeus* Thomson, 1896
 - *albinotatus* (Gravenhorst, 1829)
 - *funebris* (Gravenhorst, 1828)
 - *grammicus* (Gravenhorst, 1828)
 - *obnoxius* Gravenhorst, 1829
 - *transfuga* (Gravenhorst, 1829)
 - *truncatidens* Schmiedeknecht, 1905
- Nematopodius* Gravenhorst, 1829
 - Nematopodius formosus* Gravenhorst, 1829
 - Nematopodius* (*Nematopodius*) Gravenhorst, 1829
 - *debilis* Ratzeburg, 1852
 - *formosus* (Gravenhorst, 1829)
 - *meridionator* Aubert, 1963
 - Picardiella* Lichtenstein, 1920
 - *domator* (Poda, 1761)
 - *melanoleuca* Gravenhorst, 1829
 - Pycnocryptodes* Aubert, 1971
 - Pycnocryptodes reticulator* Aubert, 1971
 - *crenulatus* Brauns, 1896
 - Pycnocryptus* Thomson, 1873
 - Ichneumon director* Thunberg, 1822
 - *claviventris* (Kriechbaumer, 1894)
 - *director* (Thunberg, 1822)
 - *nigrifemur* (Szépligeti, 1916)
 - *nigripes* (Gravenhorst, 1829)
 - *rarus* (Habermehl, 1920)
 - Schreineria* Schreiner, 1905
 - Sycophrurus* Picard, 1919
 - *cingulipes* (Foerster, 1888)
 - *melanosoma* (Rudow, 1882)
 - Sphecophaga* Westwood, 1840
 - Cacotropa* Foerster, 1869
 - *vesparum* (Curtis, 1836)
 - Stenarella* Szépligeti, 1916
 - Parasilsila* Cheesman, 1936
 - *domator* (Poda, 1761)
 - Thrybius* Townes, 1965
 - Hoplismenus leucopygus* (Gravenhorst, 1829)
 - *praedator* (Rossi, 1792)
 - *tricolor* (Gravenhorst, 1829)
 - *ungulatus* (Gravenhorst, 1829)
 - Trachysphyrus* Haliday, 1936
 - Cyanocryptus* Cameron, 1903

- *albatorius* (Villers, 1789)
 - Ichneumon albatorius* Villers, 1789
- *crassitarsis* (Habermehl, 1918)
 - Cryptus crassitarsis* Habermehl, 1918
- *cyanator* (Gravenhorst, 1829)
- *dianae* (Gravenhorst, 1829)
 - Cryptus dianae* Gravenhorst, 1829
- *erythrogaster* (Meyer, 1933)
- *genalis* (Tschek, 1872)
- *laborator* (Thunberg, 1822)
- *latifemur* (Heinrich, 1930)
- *moschator* (Fabricius, 1787)
- *murorum* (Tschek, 1872)
- *obscurus* (Gmelin, 1790)
- *spinosus* (Gravenhorst, 1829)
- *spiralis* Fourcroy, 1785)
- *sponsor* (Fabricius, 1793)
 - Ichneumon sponsor* Fabricius, 1793
- *subquadratus* (Thomson, 1873)
- *tarsoleucus* (Schrank, 1781)
- *triguttatus* (Gravenhorst, 1829)
- *viduatorius* (Fabricius, 1804)
- *vittatorius* (Jurinae, 1807)
- Trychosis* Foerster, 1869
 - Phaedrophadnus* Cameron, 1906
 - *atrides* (Gravenhorst, 1829)
 - *gradaria* (Tschek, 1871)
 - *ingrata* (Tschek, 1871)
 - *legator* (Thunberg, 1822)
 - *mesocastana* (Tschek, 1871)
 - *neglecta* (Tschek, 1871)
 - *pauper* (Tschek, 1871)
 - *priesneri* (Rossem, 1971)
 - *tristator* (Tschek, 1871)
- Xylophrurus* Foerster, 1869
 - Nyxophilus* Foerster, 1869
 - *augustus* (Dalman, 1923)
 - *brevicornis* (Brischke, 1881)
 - *kokujevi* (Meyer, 1924)
 - *lancifer* (Gravenhorst, 1829)
- Hemigasterini* Ashmead, 1900
- Aptesis* Foerster, 1850
 - Pezoporus* Foerster, 1869
 - *acuminata* (Kriechbaumer, 1899)
 - *assimilis* (Gravenhorst, 1829)
- *cretata* (Gravenhorst, 1829)
- *curta* (Habermehl, 1935)
- *exquisita* (Schmiedeknecht, 1905)
- *femoralis* (Thomson, 1893)
- *flagitator* (Rossi, 1794)
- *gravipes* (Gravenhorst, 1829)
- *improba* (Gravenhorst, 1829)
- *jejunator* (Gravenhorst, 1807)
- *leucootarsus* (Gravenhorst, 1829)
- *nigrocincta* (Gravenhorst, 1815)
- *silvatica* (Habermehl, 1935)
- *subguttata* (Gravenhorst, 1829)
- *terminata* (Gravenhorst, 1829)
- Colocnema* Foerster, 1869
 - Phygadeuon rufinus* Gravenhorst, 1829
 - Coelocryptus* Thomson, 1893
- *albifasciator* Aubert, 1972
- *annulator* Aubert, 1966
- *rufina* (Gravenhorst, 1829)
 - Phygadeuon rufinus* Gravenhorst, 1829
 - Plectocryptus romani* Pfankuch, 1914
- Cratocryptus* Thomson, 1872
 - Cryptus furcator* Gravenhorst, 1829
- *furcator* (Gravenhorst, 1829)
- Cubocephalus* Ratzeburg, 1848
 - Cryptus fortipes* Gravenhorst, 1829
 - Chaeretymma* Foerster, 1869
 - Planocryptus* Heinrich, 1949
 - *alticola* (Habermehl, 1935)
 - *anatorius* (Gravenhorst, 1829)
 - *annulitarsis* (Thomson, 1873)
 - *associator* (Thunberg, 1822)
 - *brevicornis* (Taschenberg, 1865)
 - *distinctor* (Thunberg, 1822)
 - *erythrinus* (Gravenhorst, 1829)
 - *femoralis* (Thomson, 1873)
 - *insidiator* (Gravenhorst, 1829)
 - *longicauda* (Thomson, 1883)
 - *mirabilis* (Heinrich, 1949)
 - *nigriventris* (Thomson, 1874)
 - *silesiacus* Habermehl, 1911
 - *sternocerus* (Thomson, 1873)
 - *subpetiolatus* (Gravenhorst, 1829)
- Demopheles* Foerster, 1869
 - Phygadeuon corruptor* Taschenberg, 1865
 - Mecocryptus* Thomson, 1873

- *corruptor* (Taschenberg, 1865)
 - Echthrus* Gravenhorst, 1829
 - Ichneumon reluctator* Linnaeus, 1758
 - Sphaetes* Bremi, 1849
 - Bioleter* Meyer, 1930
- *reluctator* (Linnaeus, 1758)
 - Ichneumon reluctator* Linnaeus, 1758
- Giraudia* Foerster, 1869
 - Calocryptus* Thomson, 1873
- *grisescens* (Gravenhorst, 1829)
- *gyratoria* (Thunberg, 1822)
 - Javra* Cameron, 1903
 - Cnemocryptus* Cameron, 190
 - Monocryptus* Héllen, 1957
- *anomala* (Morley, 1908)
- *jemilleri* (Kriechbaumer, 1893)
- *opaca* (Thomson, 1873)
- *tricincta* (Gravenhorst, 1829)
 - Listrocryptus* Brauns, 1905
- *spatulatus* Brauns, 1905
- Megaplectes* Foerster, 1869
 - Cryptus furcator* Gravenhorst, 1829
 - Megaloplectes* Schultz, 1906
- *monticola* (Gravenhorst, 1829)
- Oresbius* Marshall, 1867
 - Opidnus* Foerster, 1869
- *alpinophilus* Sawoniewicz, 1993
- *arridens* (Gravenhorst, 1829)
 - Phygadeuon arridens* Gravenhorst, 1829
- *bipunctatus* (Schmiedeknecht, 1931)
- *excelsus* (Gravenhorst, 1829)
- *galactinus* (Gravenhorst, 1829)
 - Phygadeuon galactinus* Gravenhorst, 1829
- *habermehli* (Ulbricht, 1910)
- *leucopsis* (Gravenhorst, 1829)
- *romani* Sawoniewicz, 1993
- Parmotha* Townes, 1962
 - *parvula* (Gravenhorst, 1829)
 - Cryptus parvulus* Gravenhorst, 1829
- *pleuralis* (Thomson, 1873)
- Plectocryptus* Thomson, 1873
 - Ichneumon digitatus* Gmelion, 1790
- *albulatorius* (Gravenhorst, 1829)
 - Cryptus albulatorius* Gravenhorst, 1829
- *digitatus* (Gmelion, 1790)
- *poecilops* (Kriechbaumer, 1891)
- Pleolophus* Townes, 1962
 - Phygadeuon basizonus* Gravenhorst, 1829
- *basizonus* (Gravenhorst, 1829)
- *brachypterus* (Gravenhorst, 1815)
- *curtulus* Kriechbaumer, 1879
- *cerinostomus* (Gravenhorst, 1829)
- *isomorphus* (Schmiedeknecht, 1932)
- *sericans* (Gravenhorst, 1829)
- *vestigialis* (Foerster, 1850)
 - Aptesis aphyopterus* Foerster, 1850
- Polytribax* Foerster, 1869
 - Epiphobus* Foerster, 1869
 - Plesignathus* Foerster, 1869
- *arrogans* (Gravenhorst, 1829)
 - Cryptus arrogans* Gravenhorst, 1829
- *perspicillator* (Gravenhorst, 1807)
- *rufipes* (Gravenhorst, 1829)
- Schenkia* Foerster, 1869
 - Ecpaglus* Foerster, 1869
- *crassicornis* (Kriechbaumer, 1891)
- *graminicola* (Gravenhorst, 1829)
- *opacula* (Thomson, 1883)
- *rufithorax* (Strobl, 1901)
- *scopulifer* (Obertel, 1953)
- *spinolae* (Gravenhorst, 1829)
- Phygadeuontini* Foerster, 1869
- Aclastus* Foerster, 1869
 - Daetora* Foerster, 1869
- *eugracilis* Horstmann, 1980
- *flavipes* Horstmann, 1980
- *gracilis* (Thomson, 1884)
- *micator* (Gravenhorst, 1807)
- *pilosus* Horstmann, 1980
- Acrolyta* Foerster, 1869
 - Rhadinocera* Foerster, 1869
- *marginata* (Bridgman, 1883)
- *mediovittata* (Schmiedeknecht, 1897)
- *nens* (Hartig, 1838)
- *rufocincta* (Gravenhorst, 1829)
- *trochanteralis* Schmiedeknecht, 1900
- *mangeri* (Gravenhorst, 1829)
- Agasthenes* Foerster, 1869
 - Asthenoptera* Foerster, 1869
- *varitarsus* (Gravenhorst, 1829)
- Amphibulus* Kriechbaumer, 1872
 - *gracilis* (Kriechbaumer, 1872)
- Arotrepes* Townes, 1970¹
 - Cryptus pusillus* Cresson, 1864

- *minor* (Pfankuch, 1924)
- *nivosus* (Héllen, 1967)
- *parvipennis* (Thomson, 1884)
- *perfusor* (Gravenhorst, 1829)
- *rufobasalis* Horstmann, 1993
- *speculator* (Gravenhorst, 1829)²
- Atractodes* Gravenhorst, 1829²
 - Atractodes bicolor* Gravenhorst, 1829
- Atractodes (Asyncria)* Foerster, 1876
 - *acuminator* Roman, 1909
 - *albovinctus* Haliday, 1839
 - *angustipennis* Foerster, 1876
 - *assimilis* Foerster, 1876
 - *croceicornis* Haliday, 1839
 - *cryptobius* Foerster, 1876
 - *designatus* (Foerster, 1876)
 - *exilis* Haliday, 1839
 - *exitialis* Foerster, 1876
 - *faeroensis* Roman, 1916
 - *foveolatus* Gravenhorst, 1829
 - *genuinus* Foerster, 1876
 - *holmgreni* Roman, 1918
 - *picipes* Holmgren, 1860
 - *podagricus* Roman, 1909
 - *spiracularis* Roman, 1918
- Atractodes (Atractodes)* Gravenhorst, 1829
 - Zatesima* Foerster, 1876
 - *bicolor* (Gravenhorst, 1829)
 - *citator* Haliday, 1839
 - *fittoni* (Jusila, 1983)
 - *fumatus* (Haliday, 1839)
 - *gilvipes* Holmgren, 1860
 - *gravidus* (Gravenhorst, 1829)
 - *labefacto* Foerster, 1876
 - *ligatus* Foerster, 1876
 - *mesozonius* (Gravenhorst, 1829)
 - *minutus* Foerster, 1876
 - *oribates* Foerster, 1876
 - *pauxillus* (Foerster, 1876)
 - *piceicornis* Haliday, 1839
 - *praecuatus* Foerster, 1876
 - *productus* (Brischke, 1880)
 - *punctulatus* (Foerster, 1876)
 - *pusillus* (Foerster, 1876)
 - *repudiatus* Foerster, 1876
 - *riparius* Ruschka, 1913
- *rufipes* (Foerster, 1876)
- *salius* Haliday, 1839
- *subrepens* Foerster, 1876
- *subsimilis* Foerster, 1876
- *teneriventris* (Gravenhorst, 1829)
- *thomsoni* (Dalla Torre, 1902)
- *tibialis* Foerster, 1876
- *xanthoneurus* Foerster, 1876
- Atractodes (Hadractodes)* Jussila, 1979
 - Atractodes intersectus* Foerster, 1876
- *vicinus* Foerster, 1876
 - Atractodes absconditus* Foerster, 1876
- Atractodes (Rugattractodes)* Jussila, 1979
 - *alpinus* Foerster, 1876
 - *pediophilus* Foerster, 1876
 - *procerus* Foerster, 1876
- Bathythrix* Foerster, 1869⁵
 - Gausocentrus* Foerster, 1869
 - *aerea* (Gravenhorst, 1829)
 - *alter* (Kerrich, 1942)
 - *argentata* (Gravenhorst, 1829)
 - *claviger* (Taschenberg, 1865)
 - Cryptus claviger* Taschenberg, 1865
 - *collaris* (Thomson, 1896)
 - *decipiens* (Gravenhorst, 1829)
 - *fragilis* (Gravenhorst, 1829)
 - *illustris* Sawoniewicz, 1980
 - *lamina* (Thomson, 1884)
 - *linearis* (Gravenhorst, 1829)
 - Nematopodius linearis* Gravenhorst, 1829
 - *maculata* (Hellén, 1957)
 - *margaretae* Sawoniewicz, 1980
 - *montana* (Schmiedeknecht, 1905)
 - *pellucidator* (Gravenhorst, 1829)
 - *pleuralis* Sawoniewicz, 1980
 - *prominens* (Strobl, 1901)
 - *rugulosas* (Thomson, 1884)
 - *sphegina* (Gravenhorst, 1829)
 - *strigosa* (Thomson, 1884)
 - *tenuis* (Gravenhorst, 1829)
 - *thomsoni* (Kerrich, 1942)
- Blapsidotes* Foerster, 1869
 - Hemiteles melanarius* Gravenhorst, 1829
- *vicinus* Gravenhorst, 1829
- Brachypimpla* Strobl, 1901
 - Bassocryptus* Habermehl, 1919
- *brachyura* Strobl, 1902

- Ceratophygadeuon* Viereck, 1924
Remonzia Seyrig, 1952
– *gracilicornis* Horstmann, 1979
– *insularis* Horstmann, 1993
– *maritimus* Horstmann, 1979
Charitopes Foerster, 1869
Adiastola Foerster, 1869
– *areolaris* (Thomson, 1884)
Hemitelesbrunneus Morley, 1907
– *clausus* (Thomson, 1888)
– *costalis* (Thomson, 1889)
– *crassicornis* (Gravenhorst, 1829)
– *cynipinus* Thomson, 1896
– *fumipennis* (Thomson, 1889)
– *gastricus* (Holmgren, 1864)
– *londinensis* (Morley, 1947)
Hemiteles hemerobii Pfankuch, 1914
– *pilatus* Townes, 1983
– *rotundipennis* (Thomson, 1889)
Chirotica Foerster, 1869
Hemiteles insignis Gravenhorst, 1829
– *decorator* (Villers, 1789)
– *insignis* (Gravenhorst, 1829)
– *maculipennis* (Gravenhorst, 1829)
– *nigrithorax* Horstmann, 1983
Clypeoteles Horstmann, 1974
Hemiteles distans Thomson, 1884
– *distans* (Thomson, 1884)
Cremnoides Foerster, 1850
Ichneumon atricapillus Gravenhorst, 1815
Caenomeris Foerster, 1869
Stygera Foerster, 1869
– *atricapillus* (Gravenhorst, 1815)
– *costalis* Horstmann, 1992
– *rufipes* (Perkins, 1962)
Diaglyptellana Horstmann, 1981p
Hemiteles opaculus Thomson, 1884
– *punctata* Horstmann, 1981
Diaglyptelloses Aubert, 1993
– *sculpturator* (Aubert, 1977)
Gelis sculpturator Aubert, 1977
Diaglyptidea Viereck, 1913
– *araneiphaga* Narolsky, 1992
– *conformis* (Gmelin, 1790)
– *varipes* Horstmann, 1979
Dichrogaster Doumerc, 1855
Brachycephalus Foerster, 1869
Microtorus Foerster, 1869
- Xenobrachys* Foerster, 1869
Brachycranium Ashmead, 1900
– *aestivals* (Gravenhorst, 1829)
– *bischoffi* (Schmiedeknecht, 1905)
– *chrysopae* (Ashmead, 1894)
– *crassicornis* Horstmann, 1976
– *genalis* (Habermehl, 1925)
– *heteropus* (Thomson, 1896)
– *liostylus* (Thomson, 1885)
– *longicauda* (Thomson, 1884)
– *mandibularis* Horstmann, 1973
– *modesta* (Gravenhorst, 1829)
– *perlae* (Doumerc, 1855)
– *schimitscheki* (Fahringer, 1935)
Encrateola Strand, 1917
Encrates Foerster, 1869
– *laevigata* (Ratzeburg, 1848)
Endasys Foerster, 1869
Bachia Foerster, 1869
Scinacopus Foerster, 1869
Spilocryptus Thomson, 1873
– *alutaceus* (Habermehl, 1912)
– *amoenus* (Habermehl, 1912)
– *analis* (Thomson, 1883)
– *annulatus* (Habermehl, 1912)
– *areolellae* Sawoniewicz & Luman, 1992
– *brevis* (Gravenhorst, 1829)
Phygadeuon brevis Gravenhorst, 1829
– *analis* (Thomson, 1883)
– *brunnulus* Sawoniewicz & Luman, 1992
– *cnemargus* (Gravenhorst, 1829)
– *erythrogaster* (Gravenhorst, 1829)
– *eurycerus* (Thomson, 1896)
– *euxestus* (Speiser, 1908)
– *femoralis* (Habermehl, 1912)
– *hungarianus* Sawoniewicz & Luman, 1992
– *lissorulus* Sawoniewicz & Luman, 1992
– *megamelanus* Sawoniewicz & Luman, 1992
– *melanopodis* Sawoniewicz & Luman, 1992
– *melanurus* (Roman, 1909)
– *nitidus* (Habermehl, 1912)
– *parviventris* (Gravenhorst, 1829)
– *petiolus* Sawoniewicz & Luman, 1992
– *rusticus* (Habermehl, 1912)
– *rusticus* (Habermehl, 1902)
– *senilis* (Gmelin, 1790)
– *stictogastris* Sawoniewicz & Luman, 1992

- *testaceipes* (Brischke, 1891)
- *triannulalatus* Sawoniewicz & Luman, 1992
- *varipes* (Gravenhorst, 1829)
- *vulneratoor* (Gravenhorst, 1829)
- Ethelurgus* Foerster, 1869
 - Nuneches* Foerster, 1869
 - Tolmerus* Foerster, 1869
 - Platycryptus* Kriechbaumer, 1893
- *sodalis* (Taschenberg, 1865)
- *vulnerator* (Gravenhorst, 1829)
- Eudelus* Foerster, 1869
 - Calliphrurus* Foerster, 1869
 - Idemum* Foerster, 1869
- *infirmus* (Gravenhorst, 1829)
- *scabriculus* (Thomson, 1873)
- *simillimus* (Taschenberg, 1865)
- Gelis* Thunberg, 1827
 - Munilla acarorum* Linnaeus, 1758
 - Pezomachus* Gravenhorst, 1829
 - Pezolochus* Foerster, 1850
 - Catalytus* Foerster, 1851
 - Philonygnus* Foerster, 1869
- *acarorum* (Linnaeus, 1758)
- *agilis* (Fabricius, 1775)
 - Ichneumon agilis* Fabricius, 1775
- *albicinctus* (Ruthe, 1859)
- *albipalpus* (Thomson, 1884)
- *alopecosae* Horstmann, 1986
- *anthracinus* (Foerster, 1850)
- *areator* (Panzer, 1804)
- *avarus* (Foerster, 1850)
- *balteatus* (Thomson, 1885)
- *bicolor* (Villers, 1789)
- *brassicae* Horstmann, 1986
- *brevicauda* (Thomson 1884)
- *breviceps* (Thomson, 1884)
- *brevis* (Bridgman, 1883)
- *brevithorax* Roman, 1936
- *carbonarius* (De Stephani, 1884)
- *caudator* Horstmann, 1993
- *cayennator* (Thunberg, 1822)
- *cinctus* (Linnaeus, 1758)
- *cursitans* (Fabricius, 1775)
- *cyanurus* (Foerster, 1850)
- *declivis* (Foerster, 1850)
- *discedens* (Foerster, 1850)
- *distinctus* (Foerster, 1868)
- *edentatus* (Foerster, 1850)
- *elymi* (Thomson 1884)
- *exareolatus* (Foerster, 1850)
- *falcatus* Horstmann, 1986
- *fallax* (Foerster, 1850)
- *fasciitinctus* (Dalla Tarre, 1901)
- *femoralis* (Brischke, 1880)
- *festinans* (Fabricius, 1798)
- *forficator* Aubert, 1991
- *formicarius* (Linnaeus, 1758)
- *forticornis* (Foerster, 1850)
- *fortificator* Aubert, 1980
- *fumipennis* Horstmann, 1986
- *fuscicornis* (Foerster, 1850)
- *gallicator* (Aubert, 1971)
- *gibbifrons* (Thomson, 1884)
- *glacialis* (Holmgren, 1869)
- *helleni* (Kolarov, 1993)
- *hortensis* (Christ, 1791)
- *ilicicola* (Seyrig, 1927)
- *ilicicolator* Aubert, 1969
- *infumata* (Thomson, 1884)
- *heidenreichi* Habermehl, 1930
- *intermedius* (Foerster, 1850)
- *inustus* (Gravenhoorst, 1829)
- *leptogaster* (Foerster, 1850)
- *liparae* (Giraut, 1863)
- *longicauda* (Thomson, 1884)
- *longulus* (Zetterstedt, 1838)
- *lucidulus* (Foerster, 1850)
- *mangeri* (Gravenhorst, 1815)
- *marginatus* (Foerster, 1850)
- *meigenii* (Foerster, 1850)
- *melanocephala* (Schrank, 1781)
- *melanophorus* (Foerster, 1851)
- *melanogaster* (Thomson, 1884)
- *melanogonus* (Gravenhorst, 1829)
- *meuseli* (Lange, 1911)
- *micrurus* (Foerster, 1850)
- *monozonius* (Gravenhorst, 1829)
- *mutillatus* (Gmelin, 1790)
- *nigritulus* (Zetterstedt, 1838)
- *notabilis* (Foerster, 1850)
- *obscuripes* Horstmann, 1986
- *ornatulus* (Thomson, 1884)
- *pallipes* (Foerster, 1851)
- *papaveris* (Foerster, 1856)

- *pezomachorum* Ratzeburg, 1852
 - *picipes* (Gravenhorst, 1829)
 - *pilosulus* (Thomson, 1884)
 - *proximus* (Foerster, 1850)
 - *pulicarius* (Fabricius, 1793)
 - *pusillus* (De Stefani, 1884)
 - *rotundiventris* (Foerster, 1850)
 - *rubricollis* (Retzius, 1783)
 - *ruficornis* (Thunberg, 1822)
 - *rufipes* (Foerster, 1850)
 - *rufogaster* Thunberg, 1827
 - *rugifer* (Thomson, 1884)
 - *sanguinipictus* (Schmiedeknecht, 1932)
 - *semirufus* (De Stefani, 1884)
 - *spinula* (Thomson, 1884)
 - *stevenii* (Gravenhorst, 1829)
 - *stigmaticus* (Zetterstedt, 1938)
 - *taschenbergii* (Schmiedeknecht, 1897)
 - *terribilis* Schwarz, 2002
 - *thomsoni* (Schmiedeknecht, 1933)
 - *tibiator* Schwarz, 2002
 - *trux* (Foerster, 1850)
 - *vagabundus* (Foerster, 1850)
 - *venatorius* (Foerster, 1850)
 - *viduus* (Foerster, 1850)
 - *vulnerans* (Foerster, 1850)
 - *zeirapherator* (Aubert, 1966)
 - Glypticnemis* Foerster, 1869
 - Gnathocryptus* Thomson 1873
 - *atratus* Strobl, 190
 - *clypealis* (Thomson, 1883)
 - *profligator* (Fabricius, 1775)
 - *vagabunda* (Gravenhorst, 1829)
 - Phygadeuon vagabundus* Gravenhorst, 1829
 - Gnotus* Foerster, 1869
 - Hemiteles tenuicornis* Gravenhorst, 1829
 - *chionops* (Gravenhorst, 1829)
 - *czekelii* (Kiss, 1924)
 - *plectisciformis* (Schmiedeknecht, 1897)
 - *tenuipes* (Gravenhorst, 1829)
 - Gnypetomorpha* Foerster, 1869
 - Hemiteles apertus* Thomson, 1884
 - Trisacra* Foerster, 1869
 - *obscura* (Bridgman, 1883)
 - Helcostizus* Foerster, 1869
 - Cryptus brachycentrus* Gravenhorst, 1829
 - Mesocryptus* Thomson, 1873
- *restaurator* (Fabricius, 1775)
 - Hemiteles* Gravenhorst, 1829
 - Ocymorus* Foerster, 1869
 - *albipalpis* (Brischke, 1888)
 - *bipunctator* (Thunberg, 1822)
 - *?bizonatus* Pfankuch, 1910
 - *?cognatus* Brischke, 1891
 - *?completus* Ratzeburg, 1848
 - *?coxalis* Brischke, 1892
 - *?crassiceps* Ratzeburg, 1844
 - *?cylindrithorax* Taschenberg, 1865
 - *?dispar* Ratzeburg, 1844
 - *?fuscicarpus* Thomson, 1885
 - *?gastrocoelus* Ratzeburg, 1852
 - *?hospes* Ratzeburg, 1848
 - *?incertus* Taschenberg, 1865
 - *?leucomerus* Ratzeburg, 1852
 - *?liambus* Thomson, 1885
 - *?longiventris* Schiodte, 1839
 - *?lucidulus* Fonscolombe, 1852
 - *?monospilus* Gravenhorst, 1829
 - *?obliquus* Thomson, 1885
 - *?pauper* Habermehl, 1909
 - *?phloeas* Boie, 1885
 - *?pictilis* Hedwig, 1932
 - *?punctatus* Ratzeburg, 1848
 - *?pygmaeus* Brischke, 1888
 - *rubropleuralis* Kiss, 1929
 - *similis* (Gmelin, 1790)
 - *?tenellus* Habermehl, 1920
 - *?thoracicus* Ratzeburg, 1852
 - Isadelphus* Foerster, 1869
 - Hemiteles inimicus* Gravenhorst, 1829
 - Peross* Foerster, 1869
 - *armatus* (Gravenhorst, 1829)
 - *coriarius* (Taschenberg, 1865)
 - *gallicola* (Bridgman, 1880)
 - *inimicus* (Gravenhorst, 1829)
 - Lochetica* Kriechbaumer, 1892
 - Phygadeuon pimplarius* Thomson, 1884
 - *westoni* (Bridgman, 1882)
 - Lysibia* Foerster, 1869
 - Tryphon nanus* Gravenhorst, 1829
 - Pemon* Foerster, 1869
 - *nanus* (Gravenhorst, 1829)
 - Mastrus* Foerster, 1869³

- Phygadeuon neodiprioni* Viereck, 1911
Aenoplex Foerster, 1869
- *albobasalis* (Schmiedeknecht, 1933)
 - *boreaphilus* (Roman, 1939)
 - *clausus* Horstmann, 1990
 - *costalis* (Thomson, 1884)
 - *deminuens* (Hartig, 1838)
 - *fumipennis* (Thomson, 1884)
 - *inimicus* (Gravenhorst, 1829)
 - *longicauda* Horstmann, 1990
 - *mandibularis* Horstmann, 1990
 - *montanus* Horstmann, 1990
 - *nigridens* Horstmann, 1990
 - *pictipes* (Gravenhorst, 1829)
 - *rufobasalis* (Habermehl, 1920)
 - *rufulus* (Thomson, 1884)
 - *silbernageli* (Kiss, 1929)
 - *sordipes* (Gravenhorst, 1829)
 - *tenuicosta* (Thomson, 1884)
 - *varicoxis* (Taschenberg, 1865)
- Medophron* Foerster, 1869
- *Barynica* Foerster, 1869
 - *afflictor* (Gravenhorst, 1829)
 - *armatulus* (Thomson, 1888)
 - *caudatus* (Roman, 1909)
 - *crassicornis* (Gravenhorst, 1829)
 - *nigerrimus* (Hedwig, 1932)
 - *nigriceps* (Thomson, 1883)
 - *recurvus* (Thomson, 1884)
- Megacara* Townes, 1970
- *Phygadeuonlucens* Provancher, 1874
 - *hortulana* (Gravenhorst, 1829)
 - *vagans* (Gravenhorst, 1829)
- Mesoleptus* Gravenhorst, 1829
- *Ichneumon laevigatus* Gravenhorst, 1820
 - *Exolytus* Holmgren, 1859
 - *adaequator* (Foerster, 1876)
 - *adversarius* (Foerster, 1876)
 - *aequilatus* (Foerster, 1876)
 - *aggressorius* (Foerster, 1876)
 - *agilis* (Foerster, 1876)
 - *agnatus* (Foerster, 1876)
 - *alticola* (Foerster, 1876)
 - *ambiguus* (Foerster, 1876)
 - *ambulator* (Foerster, 1876)
 - *anceps* (Foerster, 1876)
 - *anguinus* (Foerster, 1876)
- *angustulus* (Foerster, 1876)
 - *annexus* (Foerster, 1876)
 - *anxiusr* (Foerster, 1876)
 - *approximatus* (Foerster, 1876)
 - *arrogans* (Foerster, 1876)
 - *assimilis* (Foerster, 1876)
 - *attenuatus* (Foerster, 1876)
 - *auxiliarius* (Foerster, 1876)
 - *beneplacitus* (Foerster, 1876)
 - *binoculus* (Foerster, 1876)
 - *biosteres* (Foerster, 1876)
 - *bizonulis* (Foerster, 1876)
 - *blandus* (Foerster, 1876)
 - *brevis* (Foerster, 1876)
 - *callidus* (Foerster, 1876)
 - *carinatus* (Foerster, 1876)
 - *cinctus* (Foerster, 1876)
 - *circumspectus* (Foerster, 1876)
 - *coarctatus* (Foerster, 1876)
 - *commixtus* (Foerster, 1876)
 - *complacens* (Foerster, 1876)
 - *comptus* (Foerster, 1876)
 - *concinnus* (Foerster, 1876)
 - *concors* (Foerster, 1876)
 - *confusus* (Foerster, 1876)
 - *contrarius* (Foerster, 1876)
 - *cooperator* (Foerster, 1876)
 - *coxalis* (Habermehl, 1920)
 - *cupidus* (Foerster, 1876)
 - *curiosus* (Foerster, 1876)
 - *cursitans* (Foerster, 1876)
 - *debilitatus* (Foerster, 1876)
 - *deceptor* (Foerster, 1876)
 - *declinans* (Foerster, 1876)
 - *defectivus* (Foerster, 1876)
 - *definitus* (Foerster, 1876)
 - *delicatus* (Foerster, 1876)
 - *derasus* (Foerster, 1876)
 - *despectus* (Foerster, 1876)
 - *devotus* (Foerster, 1876)
 - *diformis* (Foerster, 1876)
 - *diminutus* (Foerster, 1876)
 - *distans* (Foerster, 1876)
 - *distinctus* (Foerster, 1876)
 - *egregius* (Foerster, 1876)
 - *elaphrus* (Foerster, 1876)

- *elegantulus* (Foerster, 1876)
- *enodis* (Foerster, 1876)
- *erugatus* (Foerster, 1876)
- *evagator* (Foerster, 1876)
- *exaequatusatus* (Foerster, 1876)
- *exhaustorius* (Foerster, 1876)
- *exiguus* (Foerster, 1876)
- *extinctus* (Foerster, 1876)
- *extirpator* (Foerster, 1876)
- *fallax* (Foerster, 1876)
- *ficticius* (Foerster, 1876)
- *filicornis* (Thomson, 1884)
- *filiventris* (Foerster, 1876)
- *flexibilis* (Foerster, 1876)
- *foveolatus* (Foerster, 1876)
- *fractus* (Foerster, 1876)
- *?fulvipes* Gravenhorst, 1829
- *fundatus* (Foerster, 1876)
- *futilis* (Foerster, 1876)
- *gallicus* (Foerster, 1876)
- *gemellus* (Foerster, 1876)
- *genitors* (Foerster, 1876)
- *genuinus* (Foerster, 1876)
- *glabriculus* (Foerster, 1876)
- *gracilis* (Foerster, 1876)
- *gracillimus* (Habermehl, 1920)
- *graciosus* (Foerster, 1876)
- *gravabilis* (Foerster, 1876)
- *helveticus* (Foerster, 1876)
- *homologus* (Foerster, 1876)
- *debilitatus* (Foerster, 1876)
- *hospitans* (Foerster, 1876)
- *humilis* (Foerster, 1876)
- *hypoleptus* (Foerster, 1876)
- *impotens* (Foerster, 1876)
- *incitus* (Foerster, 1876)
- *incolumis* (Foerster, 1876)
- *ineditus* (Foerster, 1876)
- *infestus* (Foerster, 1876)
- *infirmus* (Foerster, 1876)
- *infligens* (Foerster, 1876)
- *intermedius* (Foerster, 1876)
- *intermixtus* (Foerster, 1876)
- *internectivus* (Foerster, 1876)
- *invalidus* (Foerster, 1876)
- *invidiosus* (Foerster, 1876)
- *invitus* (Foerster, 1876)
- *jucundus* (Foerster, 1876)
- *juvenilis* (Foerster, 1876)
- *labilis* (Foerster, 1876)
- *lepidus* (Foerster, 1876)
- *leptodomus* (Foerster, 1876)
- *leptogaster* (Foerster, 1876)
- *leviss* (Foerster, 1876)
- *limitaris* (Foerster, 1876)
- *marginatus* (Thomson, 1884)
- *?maurus* Gravenhorst, 1829
- *melanocerus* (Foerster, 1876)
- *melanurus* (Foerster, 1876)
- *mesomeristus* (Foerster, 1876)
- *mitis* (Foerster, 1876)
- *molestus* (Foerster, 1876)
- *navus* (Foerster, 1876)
- *nefastus* (Foerster, 1876)
- *neglectus* (Foerster, 1876)
- *nemophilus* (Foerster, 1876)
- *nitidulus* (Foerster, 1876)
- *nosophorus* (Foerster, 1876)
- *novellus* (Foerster, 1876)
- *obscurellus* (Foerster, 1876)
- *occultus* (Foerster, 1876)
- *oligomerus* (Foerster, 1876)
- *olistherus* (Foerster, 1876)
- *onerosus* (Foerster, 1876)
- *optabilis* (Foerster, 1876)
- *percussor* (Foerster, 1876)
- *perditorius* (Foerster, 1876)
- *peregrinus* (Foerster, 1876)
- *oligomerus* (Foerster, 1876)
- *petiolaris* (Thomson, 1884)
- *pontresinensis* (Foerster, 1876)
- *pravus* (Foerster, 1876)
- *pronus* (Foerster, 1876)
- *propinquus* (Foerster, 1876)
- *propugnator* (Foerster, 1876)
- *punctiger* (Foerster, 1876)
- *parus* (Foerster, 1876)
- *quadrifituberculatus* (Foerster, 1876)
- *quietus* (Foerster, 1876)
- *raptor* (Foerster, 1876)
- *remotus* (Foerster, 1876)
- *renitens* (Foerster, 1876)

- *requirens* (Foerster, 1876)
- *retractus* (Foerster, 1876)
- *oligomerus* (Foerster, 1876)
- *ripicola* (Thomson, 1884)
- *ruficoxatus* (Foerster, 1876)
- *rufipess* (Foerster, 1876)
- *scrutator* (Haliday, 1839)
- *seductorius* (Foerster, 1876)
- *segregatus* (Foerster, 1876)
- *signatus* (Foerster, 1876)
- *silesiacus* (Foerster, 1876)
- *similatorius* (Foerster, 1876)
- *singularis* (Foerster, 1876)
- *sobrius* (Foerster, 1876)
- *solitarius* (Foerster, 1876)
- *sollicitus* (Foerster, 1876)
- *?speciosus* (Curtis, 1837)
- *speculum* (Foerster, 1876)
- *spoliator* (Foerster, 1876)
- *?subcompressus* Gravenhorst, 1829
- *subdentatus* (Foerster, 1876)
- *subimpressus* (Foerster, 1876)
- *subrugosus* (Foerster, 1876)
- *subsulcatus* (Foerster, 1876)
- *subtilis* (Foerster, 1876)
- *taeniolatus* (Foerster, 1876)
- *tenellus* (Foerster, 1876)
- *tenuiventris* (Foerster, 1876)
- *transversator* (Thunberg, 1822)
- *trepidus* (Foerster, 1876)
- *tribulator* (Foerster, 1876)
- *trifoveolatus* (Foerster, 1876)
- *tripunctus* (Foerster, 1876)
- *unipunctus* (Foerster, 1876)
- *unitus* (Foerster, 1876)
- *vacuus* (Foerster, 1876)
- *vetustus* (Foerster, 1876)
- *vicinus* (Foerster, 1876)
- *vigilatorius* (Foerster, 1876)
- *vilis* (Foerster, 1876)
- *volubilis* (Foerster, 1876)
- Micromonodon* Kriechbaumer, 1893
- *tener* (Kriechbaumer, 1893)
- Obisiphaga* Morley, 1907
 - Aptesis stenoptera* Marshall, 1868
 - *stenoptera* (Marshall, 1868)

- Orthizema* Foerster, 1869
 - Hemiteles ornatus* Brischke, 1890
 - *amabile* (Hartig, 1939)
 - *flavicone* (Schmiedeknecht, 1905)
 - *graviceps* (Marshall, 1868)
 - *hadrocerum* (Thomson, 1884)
 - *nigriventre* (Horstmann, 1992)
 - *subannulatum* (Bridgman, 1883)
 - *triannulatum* (Thomson, 1884)
- Phygadeuon* Gravenhorst, 1829
 - Apterophygas* Foerster, 1869
 - Bathymetis* Foerster, 1869
 - Ernoctona* Foerster, 1869
 - Iselix* Foerster, 1869
 - *?aciculatus* Ratzeburg, 1852
 - *acutipennis* Thomson, 1884
 - *ambiguus* Gravenhorst, 1829
 - *arcticus* (Thomson, 1884)
 - *autumnalis* (Schmiedeknecht, 1905)
 - *bidens* Thomson, 1884
 - *borealis* (Zetterstedt, 1838)
 - *brachyurus* Thomson, 1884
 - *?campoplegooides* (Ratzeburg, 1848)
 - *canaliculatus* Thomson, 1889
 - *cephalotes* (Gravenhorst, 1829)
 - *cephalotops* (Heinrich, 1949)
 - *chilosiae* Horstmann, 1975
 - *clotho* Kriechbaumer, 1892
 - *connectens* Schmiedeknecht, 1905
 - *curvatus* (Foerster, 1875)
 - *decisus* Kriechbaumer, 1892
 - *detestator* (Thunberg, 1822)
 - *dimidiatus* (Thomson, 1884)
 - *dromicus* (Gravenhorst, 1815)
 - *dubius* (Gravenhorst, 1829)
 - *dumetorum* Gravenhorst, 1829
 - *elegans* (Foerster, 1850)
 - *eleganticornis* Schmiedeknecht, 1933
 - *exiguus* (Gravenhorst, 1829)
 - *fasciatae* Horstmann, 1986
 - *filipendulae* Horstmann, 1986
 - *flavimanus* Gravenhorst, 1829
 - *forticornis* (Kriechbaumer, 1892)
 - *fumator* (Gravenhorst, 1829)
 - *geniculatus* (Kriechbaumer, 1892)
 - *hercynicus* (Gravenhorst, 1829)
 - *interstitialis* (Schmiedeknecht, 1897)

- *lachesis* (Kriechbaumer, 1892)
- *liosternus* Thomson, 1886
- *lehmanni* Schmiedeknecht, 1905
- *leucostigmus* (Gravenhorst, 1829)
- *liosternus* Thomson, 1886
- *melanarius* Habermehl, 1919
- *monodon* Thomson, 1884
- *nitidus* Gravenhorst, 1829
- *ovaliformis* (Dalla Torre, 1901)
- *ovatus* (Gravenhorst, 1829)
- *oviventris* (Gravenhorst, 1829)
- *pallicarpus* (Thomson, 1884)
- *pullulator* (Zetterstedt, 1938)
- *punctipleuris* Thomson, 1884
- *punctiventris* Thomson, 1884
- *rhenanus* Habermehl, 1919
- *rugipectus* Thomson, 1886
- *rugulosus* (Gravenhorst, 1829)
- *serotinus* Schmiedeknecht, 1905
- *subspinosis* (Gravenhorst, 1829)
- *subtilis* (Gravenhorst, 1829)
- *tenuiscapus* Thomson, 1884
- *trichops* Thomson, 1884
- *trogloodytes* (Gravenhorst, 1829)
- *ursini* Horstmann, 1986
- *varicornis* (Gravenhorst, 1829)
- Platyrhabdus* Townes, 1970
 - Hemiteles monodon* Thomson, 1884
 - *inflatus* (Thomson, 1884)
 - *monodon* (Thomson, 1884)
- Pleurogyrus* Townes, 1970
 - Hemiteles hungerfordi* Cushman, 1930
 - *cyclogaster* (Thomson, 1884)
 - *nigricoxa* Horstmann, 1995
- Polyaulon* Foerster, 1869
 - Thaumatoty whole Foerster, 1869*
 - Myersia* Viereck, 1912
 - *atratus* Foerster, 1871
 - *contrarius* Foerster, 1871
 - *coxalis* Foerster, 1871
 - *fuscipes* Foerster, 1871
 - *fusculus* Foerster, 1871
 - *incertus* Foerster, 1871
 - *isomorphus* Foerster, 1871
 - *nigriceps* Foerster, 1871
 - *paradoxus* (Zetterstedt, 1838)
 - *pleuralis* Foerster, 1871
- *similis* Foerster, 1871
- *timidus* Foerster, 1871
- *ultorius* Foerster, 1871
- Pygocryptus* Roman, 1925
 - Phygadeuon grandis* Thomson, 1884
 - *grandis* (Thomson, 1884)
 - *rufofacialis* (Schmiedeknecht, 1933)
- Rhembobius* Foerster, 1869
 - Acanthocryptus* Thomson, 1873
 - *bifrons* (Gmelin, 1790)
 - *perscrutator* (Thunberg, 1822)
 - *quadrispinus* (Gravenhorst, 1829)
 - Phygadeuon quadrispinus* Gravenhorst, 1829
- Stibeutes* Foerster, 1850
 - Chamaezelus* Foerster, 1869
 - *curvispina* (Thomson, 1884)
 - *heinemanni* (Foerster, 1850)
- Stilpnus* Gravenhorst, 1829
 - Ichneumon* Gravenhorst, 1829
 - Stilpnus (Polyrhembia)* Foerster, 1869
 - *tenebricosus* (Gravenhorst, 1829)
 - Stilpnus (Stilpnus)* Gravenhorst, 1829
 - Ichneumon gagates* Gravenhorst, 1807
 - *blandus* (Gravenhorst, 1829)
 - *crassicornis* (Thomson, 1884)
 - *gagates* (Gravenhorst, 1807)
 - *pavoniae* (Scopoli, 1763)
 - *rossicus* Jussila, 1987
 - *subzonulus* (Foerster, 1876)
 - Stilpnus (Xestophyes)* Foerster, 1869
 - Xestophya* Foerster, 1876
 - *fallax* (Foerster, 1876)
- Sulcarius* Townes, 1970
 - Hemiteles hellbachi* Schmiedeknecht, 1905
 - *biannulatus* (Gravenhorst, 1829)
 - *bispinosus* Rudow, 1886
- Thaumatogelis* Schmiedeknecht, 1933
 - Cryptogelis* Hellén, 1944
 - *gallicus* (Seyrig, 1928)
 - *robustus* (Seyrig, 1926)
 - *vulpinus* (Gravenhorst, 1815)
- Theroscopus* Foerster, 1868
 - Chamerpes* Foerster, 1869
 - Phyrtus* Foerster, 1869
 - Thysiotorus* Foerster, 1869
 - *esenbeckii* (Gravenhorst, 1829)
 - *heteroneurus* (Schmiedeknecht, 1933)
 - *melanopygus* (Gravenhorst, 1829)
 - *micator* (Gravenhorst, 1829)

- *ornaticornis* (Schmiedeknecht, 1897)
- *pedestris* (Fabricius, 1793)
- *politus* (Bridgman, 1884)
- *rufulus* (Gmelin, 1790)
- Tricholinum* Foerster, 1868
 - Stiboscopellus* Roman, 1930
 - *ischnoceum* (Thomson, 1888)
- Tropistes* Gravenhorst, 1829
 - Pseudplimerodes* Strobl, 1902
 - *falcatus* (Thomson, 1887)
- Uchidella* Townes, 1957
 - Itamus* Foerster, 1869
 - *longicaudata* Horstmann, 1993
 - *marginata* (Kiss, 1924)
- Xenolytus* Foerster, 1869
 - Sternocryptus* Roman, 1925
 - *bitinctus* (Gmelin, 1790)
- Xiphulcus* Townes, 1870
 - Hemiteles longulus* Thomson, 1884
 - *additor* Aubert, 1977
 - *constrictus* (Thomson, 1887)
 - *floricolator* (Gravenhorst, 1829)
 - *szujeckii* Sawoniewicz, 1978
- Zoophthorus* Foerster, 1869
 - Chaetomastrus* Hellén, 1967
 - *bridgmani* (Schmiedeknecht, 1897)
 - *cynipinus* (Thomson, 1884)
 - *dodecellae* (Obrtel & Sedivý, 1960)
 - *graculus* (Gravenhorst, 1829)
 - *lapponicus* Horstmann, 1990
 - *palpator* (Müller, 1776)
 - *platygaster* (Schmiedeknecht, 1897)
- Ctenopelmatinae* Foerster, 1869
- Ctenopelmatini* Foerster, 1869
- Ctenopelma* Holmgren, 1857
 - Diedrus* Foerster, 1869
 - *luciferum* (Gravenhorst, 1829)
 - Mesochorus lucifer* Gravenhorst, 1829
 - *luteum* (Holmgren, 1857)
 - *nigripenne* (Gravenhorst, 1829)
 - Exetastes nigripennis* Gravenhorst, 1829
 - *nigrum* (Holmgren, 1857)
 - *rufiventre* (Gravenhorst, 1829)
 - Eryma stygium* Kriechbaumer, 1891
 - *xanthostigma* (Holmgren, 1857)
- Homaspis* Foerster, 1869
 - *flavicornis* (Holmgren, 1857)
 - *narrator* (Gravenhorst, 1829)
 - *robusta* (Thomson, 1893)
 - *rufina* (Gravenhorst, 1829)
 - Mesoleptus rufinus* Gravenhorst, 1829
- *subalpina* (Schmiedeknecht, 1913)
- *varicolor* (Thomson, 1893)
- Notopygus* Holmgren, 1857
 - *bicarinatus* (Teunissen, 1953)
 - *emarginatus* (Holmgren, 1857)
 - *insignis* Kriechbaumer, 1891
 - *niger* (Gehrs, 1908)
 - *nigricornis* Kriechbaumer, 1891
 - *xanthocerus* Kriechbaumer, 1891
- Xenoschesis* Foerster, 1869
 - Exastes fulviprs* Gravenhorst, 1829
- Xenoschesis (Polycinetis)* Foerster, 1869
 - Notopygus resplendens* Holmgren, 1857
 - *fulvicornis* (Kriechbaumer, 1891)
 - *resplendens* (Holmgren, 1857)
- Xenoschesis (Xenoschesis)* Foerster, 1869
 - Exastes fulviprs* Gravenhorst, 1829
 - Glyptocentrus* Kriechbaumer, 1894
 - *aethiops* (Gravenhorst, 1829)
 - *fulvipesps* (Gravenhorst, 1829)
- Euryproctini* Thomson, 1883
- Anisotacrus* Schmiedeknecht, 1913
 - *tenellus* (Holmgren, 1857)
 - *xanthostigma* (Gravenhorst, 1829)
- Euryproctus* Holmgren, 1857
 - *annulatus* (Gravenhorst, 1829)
 - Mesoleptus annulatus* Stephens, 1835
 - *bivinctus* (Holmgren, 1857)
 - *mundus* (Gravenhorst, 1820)
 - *nemoralis* (Geoffroy, 1785)
 - Ichneumon digitator* Thunberg, 1822
 - *plantator* (Thunberg, 1822)
- Gunomeria* Schmiedeknecht, 1907
 - *sordida* (Gravenhorst, 1829)
- Hadrodactylus* Foerster, 1869
 - Ichneumon tiphae* Geoffroy, 1785
 - Meropaches* Schmiedeknecht, 1913
 - *bidentulus* (Thomson, 1883)
 - *femoralis* (Holmgren, 1857)
 - *flavifrons* (Fabricius, 1798)

- *fugax* (Gravenhorst, 1829)
 - Mesoleptus fugax* Gravenhorst, 1829
 - *insignis* (Kriechbaumer, 1891)
 - *nigrifemur* Thomson, 1883
 - *paludicola* (Holmgren, 1856)
 - *semirufus* (Holmgren, 1858)
 - *typhae* (Geoffroy, 1785)
 - *villosulus* Thomson, 1883
 - Hypamblys* Foerster, 1869
 - Mesolyptus cingulatus* Gravenhorst, 1829
 - *albopictus* (Gravenhorst, 1829)
 - *slaviceki* Gregor, 1935
 - *variabilis* (Teunissen, 1953)
 - Hypsantyx* Pfankuch, 1906
 - *lituratorius* (Linnaeus, 1761)
 - Mesoleptidea* Viereck, 1812
 - Mesoleptus cingulatus* Gravenhorst, 1829
 - *amoena* (Holmgren, 1857)
 - *cingulata* (Gravenhorst, 1829)
 - *hilaris* (Gravenhorst, 1829)
 - *prosoleuca* (Gravenhorst, 1820)
 - *stalii* (Holmgren, 1858)
 - *strandi* (Gregor, 1937)
 - Occapes* Townes, 1970
 - Townesia* (Brischke, 1878)
 - Pantorhaestes* Foerster, 1869
 - *xanthostomus* (Gravenhorst, 1829)
 - Phobetes* Foerster, 1869
 - Tryphon fuscicornis* Holmgren, 1856
 - *atomator* (Müller, 1776)
 - *cerinostomus* (Gravenhorst, 1829)
 - *femorator* (Thomson, 1893)
 - *leptocerus* (Gravenhorst, 1820)
 - *nigriceps* (Gravenhorst, 1829)
 - Syndipnus* Foerster, 1869
 - *abbreviatus* Roman, 1909
 - *albicruris* (Gravenhorst, 1829)
 - *angulatus* Roman, 1909
 - *atricornis* (Thomson, 1883)
 - *macrocerus* (Thomson, 1887)
 - Synodites* Foerster, 1869
 - Tryphon assimilis* Holmgren, 1858
 - *hilaris* (Woldstedt, 1880)
 - *notatus* (Gravenhorst, 1829)
 - Synomelix* Foerster, 1869
 - *albipes* (Gravenhorst, 1829)
 - *perfida* (Woldstedt, 1874)
- Zemiophora* Foerster, 1869
- Tryphon scutulatus* Hartig, 1838
 - *scutulata* (Hartig, 1838)
 - *hamulus* (Gravenhorst, 1829)
 - Mesoleius nobilis* Holmgren, 1857
 - *hyperboreus* (Holmgren, 1857)
 - *infidus* Woldstedt, 1877
 - *viduus* (Holmgren, 1857)
- Himerta* Foerster, 1869
- Euryproctus bisannulatus* Thomson, 1883
 - *defectiva* (Gravenhorst, 1820)
 - bisannulata* Thomson, 1883
 - *pfeifferi* Bauer, 1939
 - *scutellaris* (Kriechbaumer, 1891)
- Hyperbatus* Foerster, 1869
- Mesoleius segmentator* Holmgren, 1857
 - *segmentator* (Holmgren, 1857)
 - *sternoxanthus* (Gravenhorst, 1829)
- Lagarotis* Foerster, 1869
- Ichneumon semicaligatus* Gravenhorst, 1820
 - Oneista* Foerster, 1869
 - *debitor* (Thunberg, 1822)
 - *erythrocera* (Gravenhorst, 1829)
 - *semicaligata* (Gravenhorst, 1820)
 - *simulator* Heinrich, 1952
- Lamachus* Foerster, 1869
- Tryphon lophyrum* Hartig, 1838
 - Torocampus* Schmiedeknecht, 1913
 - *coalitorius* (Thunberg, 1822)
 - *eques* (Hartig, 1838)
 - *frutetorum* Hartig, 1838
 - *transiens* (Ratzeburg, 1852)
- Mesoleius* Holmgren, 1856
- Tryphon aulicus* Gravenhorst, 1829
 - *affinis* (Brischke, 1892)
 - *aulicus* (Gravenhorst, 1829)
 - *dubius* (Holmgren, 1857)
 - *geniculatus* Holmgren, 1857
 - *immarginatus* Thomson, 1893
 - *pyriformis* (Ratzeburg, 1852)
 - *sinuatus* (Thomson, 1893)
- Otlophorus* Foerster, 1869
- *anceps* (Holmgren, 1857)
 - *inflammator* Aubert, 1970
 - *italicus* (Gravenhorst, 1829)
 - *melanocarus* (Thomson, 1893)
 - *pictus* Pfankuch, 1906
 - *pulverulentus* (Holmgren, 1857)
 - *senilis* (Holmgren, 1876)

- Perispuda* Foerster, 1869
- Mesoleptus facialis* Gravenhorst, 1829
 - Zaplethis* Foerster, 1869
 - *facialis* (Gravenhorst, 1829)
 - *sulphurata* (Gravenhorst, 1829)
- Protarchus* Foerster, 1869
- Tryphon rufus* Gravenhorst, 1829
 - Zacalles* Foerster, 1869
 - *heros* Holmgren, 1857
 - *testatorius* (Thunberg, 1822)
- Rhinotorus* Foerster, 1869
- Spudaea longicornis* Schmiedeknecht, 1914
 - *alpinus* (Roman, 1909)
 - *compactor* (Thunberg, 1822)
 - Ichneumon compactor* Thunberg, 1822
 - *leucostomus* (Gravenhorst, 1829)
 - Mesoleius impressus* Brischke, 1871
- Saotis* Foerster, 1869
- Mesoleius brevispina* Thomson, 1883
 - *dorsata* (Thomson, 1888)
 - *flavopunctata* Pfankuch, 1906
 - *longiventris* (Thomson, 1888)
 - *mirabilis* Schmiedeknecht, 1914
 - *nigriventris* (Thomson, 1888)
- Scopesis* Foerster, 1869
- Mesoleius guttiger* Holmgren, 1857
 - Hyposyntactus* Ashmead, 1902
 - *areolaris* (Pfankuch, 1921)
 - *bicolor* (Gravenhorst, 1829)
 - *frontator* (Thunberg, 1822)
 - *gesticator* (Thunberg, 1822)
 - *obscura* (Holmgren, 1857)
 - *rubrotincta* (Schmiedeknecht, 1914)
 - *suspicax* (Holmgren, 1876)
 - *tegularis* (Thomson, 1893)
- Seleucus* Holmgren, 1860
- *cuneiformis* Holmgren, 1860
- Perilissini* Thomson, 1883
- Absyrtus* Holmgren, 1859
- *vernalis* Bauer, 1961
 - *vicinator* (Thunberg, 1822)
- Lathiponus* Foerster, 1869
- *bicolor* (Brischke, 1878)
- Lathrolestes* Foerster, 1869
- Lathrolestes (Lathrolestes)* Foerster, 1869
- Camporychus* Foerster, 1869
 - *abdominalis* (Brischke, 1878)
 - *albicinctus* (Habermehl, 1922)
 - *caudatus* (Thomson, 1883)
 - *citreus* (Brischke, 1878)
 - *citrofrontalis* Schmiedeknecht, 1912
 - *clypeatus* (Zetterstedt, 1838)
 - *bipunctatus* (Bridgman, 1882)
 - *luteolator* (Gravenhorst, 1829)
 - *luteolus* (Thomson, 1883)
 - *macropygus* (Holmgren, 1857)
 - *orbitalis* (Gravenhorst, 1829)
 - *pictilis* (Holmgren, 1857)
 - *verticalis* (Brischke, 1871)
- Lophyroplectus* Thomson, 1883
- *oblongopunctatus* (Hartig, 1838)
 - Ichneumon luteator* Fabricius, 1798
- Oetophorus* Foerster, 1869
- *naevius* (Gmelin, 1790)
- Opheltes* Holmgren, 1859
- *glaucopterus* (Linnaeus, 1758)
- Perilissus* Foerster, 1855
- *buccinator* Holmgren, 1855
 - *filicornis* (Gravenhorst, 1820)
 - *grandiceps* (Thomson, 1887)
 - *lucidulus* Holmgren, 1855
 - *lutescens* Holmgren, 1856
 - *pallidus* (Gravenhorst, 1829)
 - Mesoleptus pallidus* Gravenhorst, 1829
- Priopoda* Holmgren, 1856
- *apicaria* (Geoffroy, 1785)
 - *xanthopsana* (Gravenhorst, 1829)
- Synoecetes* Foerster, 1869
- *anterior* (Thomson, 1873)
 - *blancoburgensis* Schmiedeknecht, 1933
 - *tenuicornis* (Gravenhorst, 1829)
- Trematopygodes* Aubert, 1968
- *auriculator* Hinz, 1980
 - *rarus* Horstmann, 1990
- Zaplethocornia* Schmiedeknecht, 1912
- Ichneumon procurator* Gravenhorst, 1820
 - Nictula* Burks, 1952
 - *procurator* (Gravenhorst, 1820)

Pionini Smith & Shenefelt, 1955

Asthenara Foerster, 1869

Asthenarus crassifemur Thomson, 1889

– *socia* (Holmgren, 1857)

Glyptorhaestus Thomson, 1894

Loxoneurus Schmiedeknecht, 1913

Oocenteter Cushman, 1935

– *boschmani* Teunissen, 1953

– *periclistor* Hinz, 1975

– *pumilus* Hinz, 1975

– *punctatus* (Thomson, 1890)

– *punctulatus* (Woldstedt, 1877)

– *selandrivorus* (Girault, 1872)

Hodostates Foerster, 1869

Gnesia Foerster, 1869

Esigna Perkins, 1962

– *palustris* (Habermehl, 1925)

Labrossyta Foerster, 1869

Ichneumon swcotopterus Gravenhorst, 1820

Liotryphon Strobl, 1903

– *castellana* (Seyrig, 1928)

– *scoptoptera* (Granenhorst, 1820)

Lethades Davis, 1897

Adelognathustexanus Ashmead, 1890

– *curvispina* (Thomson, 1883)

– *imperfecti* Hinz, 1996

– *laricis* Hinz, 1976

– *poloniae* Hinz, 1996

– *schmiedeknechti* Hinz, 1996

Phaestus Foerster, 1869

Rhaestus heterocerus Thomson, 1893

– *anomalus* (Brischke, 1871)

Pion Schiøtte, 1839

Mesoleptus fortipes Gravenhorst, 1829

Catoglyptus Foerster, 1855

– *crassipes* (Holmgren, 1857)

Catoglyptus crassipes Holmgren, 1857

– *fortipes* (Gravenhorst, 1829)

Catoglyptus pictus Pfankuch, 1924

– *stammeri* Bauer, 1958

Rhaestus Thomson, 1883

Grypocentrus rufipes Holmgren, 1857

– *lativentris* (Holmgren, 1858)

– *rufipes* (Holmgren, 1857)

Trematopygus assimilis Holmgren, 1858

Rhorus Foerster, 1869

Tryphon mesoxanthus Gravenhorst, 1829

Dolichoblastus Strobl, 1903

– *binotatus* (Kriechbaumer, 1897)

– *chrysopus* (Gmelin, 1790)

Monoblastus caproni Bridgman, 1882

– *chrysopygus* Roman, 1909

– *extirpatorius* (Gravenhorst, 1829)

Tryphon extirpatorius Gravenhorst, 1829

– *fasciatus* (Gravenhorst, 1829)

– *femoralis* (Holmgren, 1857)

– *lapponicus* (Roman, 1909)

– *nigritars* (Gravenhorst, 1829)

– *palustris* (Holmgren, 1857)

– *punctus* (Gravenhorst, 1829)

Tryphon mesoxanthus Gravenhorst, 1829

– *substitutor* (Thunberg, 1822)

Monoblastus nigrinus Habermehl, 1909

Symphera Foerster, 1869

Tryphon barrus Cresson, 1868

– *antilope* (Gravenhorst, 1829)

Mesoleptus antilope Gravenhorst, 1829

– *canaliculatus* (Thomson, 1893)

– *foveolator* (Holmgren, 1856)

– *jactator* (Thunberg, 1822)

Ichneumon ambulator Thunberg, 1822

– *montana* (Gravenhorst, 1829)

– *splendens* (Strobl, 1903)

– *sulcatus* (Thomson, 1893)

– *ullrichi* (Tschech, 1869)

Syntactus Foerster, 1869

Ichneumon delusor Linnaeus, 1858

– *minor* Holmgren, 1857

Catoglyptus minor Holmgren, 1857

Trematopygus Holmgren, 1857

Amorphognathon Foerster, 1869

Rhigelus Foerster, 1869

– *dubitator* Hinz, 1982

– *lethierryi* Thomson, 1893

– *melanocerus* (Gravenhorst, 1829)

Tryphon romanii Heinrich, 1929

– *ruficornis* Zetterstedt, 1838

– *spiniger* Hinz, 1976

– *vellicans* (Gravenhorst, 1829)

Tryphon vellicans Gravenhorst, 1829

Scolobatini Schmiedeknecht, 1911

Scolobates Gravenhorst, 1829

Aglypus Giraud, 1872

Parabraconia Schmiedeknecht, 1914

– *auriculatus* (Fabricius, 1804)

- Ichneumon elevator* Thunberg, 1822
Ichneumon hylotomae Kriechbaumer, 1877
– *longicornis* (Gravenhorst, 1829)
– *nigerrimus* Ulbricht, 1922
Cyllocerinae Wahl, 1990
- Cylloceria* Schiødte, 1838
Phytodietus caligatus Gravenhorst, 1829
Asphragis Foerster, 1869
– *alpigena* (Strobl, 1902)
– *fusciventris* Hellén, 1958
– *imperspicua* (Rossem, 1987)
– *melancholica* (Gravenhorst, 1820)
– *occupator* (Gravenhorst, 1829)
– *suerinensis* (Brauns, 1905)
– *sylvestris* (Gravenhorst, 1829)
- Diacritinae** Townes, 1965
- Diacritus* Foerster, 1869
Mesostenus rufipes Provancher, 1875
Stenolabis Kriechbaumer, 1894
– *aciculatus* (Vollenhoven, 1878)
Stenolabis cingulatus Kriechbaumer, 1894
- Diplazontinae** Viereck, 1918
- Bioblapsis* Foerster, 1869
Trichomasrix Vollenhoven, 1878
– *polita* (Vollenhoven, 1878)
Campocraspedon Uchida, 1957
Campocraspedonsatoi Uchida, 1957
– *annulitarsis* (Hedwig, 1838)
Homocidus arcanus Stelfox, 1941
– *caudatus* (Thomson, 1890)
Daschia Diller, 1970
Homotropus brevitarsis Thomson, 1890
– *brevitarsis* (Thomson, 1890)
Homotropus brevitarsis Thomson, 1890
- Diplazon* Nees, 1818
Ichneumon laetatorius Fabricius, 1781
– *annulatus* (Gravenhorst, 1829)
Bassus multicolor Gravenhorst, 1829
– *laetatorius* (Fabricius, 1781)
– *pectatorius* (Thunberg, 1822)
Ichneumon augustorius Thunberg, 1822
– *scutatorius* Teunissen, 1943
– *tibiatorius* (Thunberg, 1822)
– *varicoxa* (Thomson, 1890)
- Enizemum* Foerster, 1869
Bassus tibialis Cresson, 1868
– *nigricorne* (Thomson, 1890)
– *ornatum* (Gravenhorst, 1828)
– *schwarzi* Diller, 1987
Phtorima Foerster, 1869
Phtorimus Thomson, 1890
– *compressa* (Desvignes, 1856)
– *obscuripennis* (Hedwig, 1838)
– *picta* (Habermehl, 1925)
Promethes Foerster, 1869
Liopsis Foerster, 1869
– *melanaspis* (Thomson, 1890)
– *sexcinctus* (Brauns, 1896)
– *sulcator* (Gravenhorst, 1829)
Sussaba Cameron, 1909
– *cognata* (Holmgren, 1858)
Promethus albicoxa Thomson, 1890
– *dorsalis* (Holmgren, 1858)
– *erigator* (Fabricius, 1793)
– *flavipes* (Lucas, 1949)
– *pulchella* (Holmgren, 1858)
– *punctiventris* (Thomson, 1890)
Syrphocontonus Foerster, 1869
Homotropus Foerster, 1869
Homocidus Morley, 1911
– *canaliculatus* (Hedwig, 1839)
– *crassicrus* (Thomson, 1890)
– *crassicornis* (Thomson, 1890)
– *elegans* (Gravenhorst, 1829)
– *fissorius* (Gravenhorst, 1829)
– *haemorrhoidalis* (Szépligeti, 1898)
– *insignis* (Hedwig, 1939)
– *megaspis* (Thomson, 1890)
– *nigritarsus* (Gravenhorst, 1829)
– *pallipes* (Gravenhorst, 1829)
– *pictus* (Gravenhorst, 1829)
– *pulcher* (Holmgren, 1858)
– *signatus* (Gravenhorst, 1829)
– *strigator* (Fabricius, 1793)
– *subopacus* (Stelfox, 1841)
– *tarsatorius* (Panzer, 1809)
Syrphophilus Dasch, 1964
Bassus bizonarius Gravenhorst, 1829
– *bizonarius* (Gravenhorst, 1829)
Bassus cingulatus Holmgren, 1858
– *tricinctarius* (Thunberg, 1822)

- Tymmophorus* Schmiedeknecht, 1913
Zootrephes Foerster, 1869
– *obscuripes* Gravenhorst, 1829
– *rufiventris* (Gravenhorst, 1829)
Woldstedtius Carlson, 1979
Bassus biguttatus Gravenhorst, 1829
– *biguttatus* (Gravenhorst, 1829)
– *citropectorialis* (Schmiedeknecht, 1926)
– *flavolineatus* (Gravenhorst, 1829)
– *holarcticus* (Diller, 1969)
Xestopelta Dasch, 1964
Syrphoconus vertebratus Cushman, 1922
– *gracillima* (Schmiedeknecht, 1926)
Homocidus amabilis Habermehl, 1935
- Eucerotinae** Viereck, 1919
- Euceros* Gravengorst, 1829
Eumesius Westwood, 1840
– *albitarsus* (Curtis, 1837)
– *unispina* (Kasparyan, 1984)
- Ichneumoninae** Latreille, 1802
- Alomyini** Foerster, 1869
- Aethcerus* Wesmael, 1945
– *discolor* (Wesmael, 1845)
– *dispar* (Wesmael, 1845)
– *foveolatus* (Gregor, 1940)
– *graniger* Thomson, 1891
– *longulus* (Wesmael, 1845)
– *nitidus* (Wesmael, 1845)
– *placidus* (Wesmael, 1845)
– *porcellus* Holmgren, 1890
– *rugifrons* Holmgren, 1890
Alomya Panzer, 1806
Ichneumon debellator Fabricius, 1775
Halomya Billberg, 1820
– *debellator* (Fabricius, 1775)
Ichneumon fischeri Schrank, 1776
Ichneumon ovator Fabricius, 1793
– *pygmaea* Heinrich, 1949
– *ripulator* Bauer, 1966
– *semiflava* Stephens, 1835
Baeosemus Foerster, 1869
Ichneumon mitigosus Gravenhorst, 1829
- *mitigosus* (Gravenhorst, 1829)
Centeterus Wesmael, 1845
– *confector* (Gravenhorst, 1829)
Ichneumon confector Gravenhorst, 1829
– *major* Wesmael, 1845
– *nigricornis* Thomson, 1891
– *rubiginosus* (Gmelin, 1790)
Colpognathus Wesmael, 1845
Ichneumon celerator Gravenhorst, 1807
– *celerator* (Gravenhorst, 1807)
Ichneumon procerus Gravenhorst, 1829
– *divisus* (Thomson, 1891)
– *postfurcalis* Constantineanu, 1959
Diadromus Wesmael, 1945
Ichneumon troglodytes Gravenhorst, 1829
– *albinotatus* (Gravenhorst, 1829)
– *arrisor* (Wesmael, 1945)
– *candidatus* (Gravenhorst, 1829)
Ichneumon guttulatus Gravenhorst, 1829
– *collaris* (Gravenhorst, 1829)
Phaeogenes similis Bridgman, 1881
– *intermedius* (Wesmael, 1945)
Phaeogenes exilicornis Berthoumieu, 1899
– *pimplarius* (Wesmael, 1948)
– *pulchellus* Wesmael, 1945
Ichneumon imbellis Wesmael, 1945
– ssp. *Meridionator* Aubert, 1959
– *pygmaeus* Brischke, 1862
– *rufiventris* Strobl, 1904
– *subtilicornis* (Gravenhorst, 1829)
– *tenax* Wesmael, 1945
– *troglodytes* (Gravenhorst, 1829)
– *truncatus* (Gravenhorst, 1829)
– *ustulatus* Holmgren, 1890
– *varicolor* (Wesmael, 1945)
Diaschisaspis Foerster, 1869
– *campolegooides* Holmgren, 1890
Dicaelotus Wesmael, 1845
Ichneumon pumilus Gravenhorst, 1829
Dicaelotus (Dicaelotus) Wesmael, 1845
Deloglyptus Foerster, 1869
Holcrepis Foerster, 1869
– *andrei* Berthoumieu, 1897
– *cameroni* (Bridgman, 1881)
– *crassifemur* (Thomson, 1891)
– *erythrogaster* (Holmgren, 1890)
– *erythrostoma* Wesmael, 1845
– *gravis* (Gravenhorst, 1829)

- *infexus* Thomson, 1891
 - *kriechbaumeri* (Holmgren, 1890)
 - *parvulus* (Gravenhorst, 1829)
 - *pictus* (Schmiedeknecht, 1903)
 - *pudibundus* (Wesmael, 1845)
 - *pumilus* (Gravenhorst, 1829)
 - *punctiventris* (Thomson, 1891)
 - Deloglyptus punctiventris* Thomson, 1891
 - *pusillus* Holmgren, 1855
 - *pusillator* (Gravenhorst, 1829)
 - *resplendens* (Holmgren, 1890)
 - *ruficoxatus* (Gravenhorst, 1829)
 - *rufilimbatus* (Gravenhorst, 1820)
 - *rufoniger* Berthoumieu, 1897
 - *suspectus* Perkins, 1953
 - *trochanteratus* Brischke, 1887
 - Dicaelotus (Gnathichneumon)* Aubert, 1958
 - *mandibulator* Aubert, 1958
 - Dilleritomus* Aubert, 1979
 - *apertor* Aubert, 1979
 - Diophanes* Foerster, 1869
 - Phaeogenes plesius* Viereck, 1912
 - *callopus* (Wesmael, 1845)
 - *fulvitarsis* (Wesmael, 1845)
 - *invisor* (Thunberg, 1822)
 - *maculicornis* (Stephens, 1835)
 - *muricifer* (Holmgren, 1890)
 - *rusticatus* (Wesmael, 1845)
 - *tegularis* (Thomson, 1891)
 - Eparces* Foerster, 1869
 - Centeterus grandiceps* Thomson, 1891
 - *grandiceps* Thomson, 1891
 - *ruficornis* Foerster, 1869
 - Epitomus* Foerster, 1869
 - *alpicola* (Strobl, 1901)
 - *infuscatus* (Gravenhorst, 1829)
 - Hemitelse parvus* Thomson, 1891
 - *proximus* (Perkins, 1953)
 - Eriplatys* Foerster, 1869
 - Herpestomus ardeicollis* Wesmael, 1945
 - *ardeicollis* (Wesmael, 1945)
 - *sawoniewiczi* Diller, 1993
 - Hemichneumon* Wesmael, 1857
 - *subdolus* Wesmael, 1857
 - Hemiteles elongatus* Ratzeburg, 1852
 - Herpestomus* Wesmael, 1945
 - Ichneumon brunnicornis* Gravenhorst, 1829
- *arridens* (Gravenhorst, 1829)
 - *brunnicornis* (Gravenhorst, 1829)
 - *crassicornis* Schmiedeknecht, 1903
 - *dichrous* Schmiedeknecht, 1903
 - *nasutus* (Wesmael, 1945)
 - Heterischnus* Wesmael, 1859
 - Rhexidermus* Foerster, 1869
 - *anomalus* (Wesmael, 1857)
 - *bicolorator* (Aubert, 1965)
 - *debilis* (Gravenhorst, 1829)
 - *moravicus* (Gregor, 1939)
 - *nigricollis* (Wesmael, 1845)
 - *nigrinus* (Giraud, 1872)
 - *pictipes* (Kriechbaumer, 1894)
 - *pulex* (Müller, 1776)
 - *ridibundus* (Costa, 1885)
 - *thoracicus* (Gravenhorst, 1829)
 - Ischnus thoracicus* Gravenhorst, 1829
 - *truncator* (Fabricius, 1798)
 - Mevesia* Holmgren, 1864
 - Phaeogenes argutus* Wesmael, 1945
 - *arguta* (Wesmael, 1945)
 - *guttata* Perkins, 1953
 - Misetus* Wesmael, 1945
 - *oculatus* (Wesmael, 1945)
 - Oiorhinus* Wesmael, 1945
 - *pallipalpis* (Wesmael, 1945)
 - Oronotus* Wesmael, 1945
 - Fedalma* Cameron, 1903
 - *binotatus* (Gravenhorst, 1829)
 - Phygadeuon binotatu* Gravenhorst, 1829
 - Orotylus* Holmgren, 1890
 - Diadromus mitis* Wesmael, 1948
 - *mitis* (Wesmael, 1948)
 - Phaeogenes* Wemael, 1945
 - Ichneumon semivulpinus* Gravenhorst, 1829
 - *alternans* Wesmael, 1945
 - *amaenus* (Wesmael, 1945)
 - *anderi* Teunissen, 1972
 - *austriacus* (Gravenhorst, 1829)
 - ? *bicolor* Brischke, 1862
 - *coryphaeus* (Wesmael, 1945)
 - *cryptorius* (Zetterstedt, 1838)
 - *curator* (Thunberg, 1822)
 - *distinctus* (Bridgman, 1887)
 - *foveolatus* Perkins, 1953
 - *fur* Strand, 1918

- *heterogonus* Holmgren, 1890
 - *impiger* (Wesmael, 1845)
 - ? *impressus* Brischke, 1890
 - *jucundus* Wesmael, 1845
 - *melanogonos* (Gmelin, 1790)
 - *mysticus* (Wesmael, 1945)
 - ? *nigratus* (Brischke, 1862)
 - *parvulus* Pfeffer, 1913
 - *planifrons* (Wesmael, 1945)
 - *planipectus* Holmgren, 1890
 - *plutellae* Kurdjumov, 1912
 - *pullulatorius* (Zetterstedt, 1838)
 - *rubripictus* Wesmael, 1857
 - *semivulpinus* (Gravenhorst, 1829)
 - *socialis* (Ratzeburg, 1852)
 - *spiniger* (Gravenhorst, 1829)
 - *subuliferus* Holmgren, 1890
 - ? *tristator* Habermehl, 1909
 - ? *trochanteratus* Brischke, 1862
 - ? *umbripennis* Brischke, 1891
 - ? *variabilis* Brischke, 1862
 - Stenodontus* Berthoumieu, 1897
 - Gnathoxis* Wesmael, 1945
 - *biguttatus* (Gravenhorst, 1829)
 - *marginellus* (Gravenhorst, 1829)
 - *meridionator* (Aubert, 1959)
 - *theresae* Pic, 1901
 - ? *tristis* (Brischke, 1892)
 - Trachyarus* *corvinus* Thomson, 1891
 - *corvinus* (Thomson, 1891)
 - *prominulus* Diller, 1989
 - Tycherus* Foerster, 1869
 - Micropus* Foerster, 1869
 - Proscus* Holmgren, 1890
 - *bellicornis* (Wesmael, 1945)
 - *capitosus* (Holmgren, 1890)
 - *coriaceus* (Perkins, 1953)
 - *curtus* Ranin, 1983
 - *discoidalis* (Ratzeburg, 1852)
 - *dodecellae* Ranin, 1983
 - *elongatus* (Thomson, 1891)
 - *eques* (Wesmael, 1945)
 - *flavidens* (Wesmael, 1945)
 - *fuscibucca* (Berthoumieu, 1901)
 - *fuscicornis* (Wesmael, 1945)
 - *helleni* Ranin, 1983
- *infimus* (Wesmael, 1945)
 - *ischiomelinus* (Gravenhorst, 1829)
 - *juvenilis* (Wesmael, 1948)
 - *kuhmoensis* Ranin, 1983
 - *macilentus* (Wesmael, 1945)
 - *modestus* (Wesmael, 1945)
 - *nigridens* (Wesmael, 1945)
 - *nigrifemoratus* (Ranin, 1983)
 - *ophthalmicus* (Wesmael, 1945)
 - *osculator* (Thunberg, 1822)
 - *septentrionalis* (Holmgren, 1890)
 - *stipator* (Wesmael, 1945)
 - *suspicax* (Wesmael, 1945)
 - *teres* (Berthoumieu, 1906)
 - *vagus* (Berthoumieu, 1899)
 - *vereundus* Ranin, 1983
- Calajoppini* Heinrich, 1962
- Callajoppa* Cameron, 1903
 - *cirrogaster* (Schrank, 1781)
 - Ichneumon cirrogaster* Schrank, 1781
 - *exaltatoria* (Panzer, 1804)
 - Ichneumon exaltatorius* Panzer, 1804
 - Psilomastax* Tischbein, 1868
 - *pyramidalis* (Tischbein, 1868)
 - Trogus* Panzer, 1806
 - Ichneumon coerulator* Fabricius, 1804
 - Dinotomus* Foerster, 1869
 - *lapidator* (Fabricius, 1787)
 - *violaceus* (Mocsáry, 1883)
- Eurylabini* Heinrich, 1934
- Eurylabus* Wesmael, 1945
 - Mischophorus* Kriechbaumer, 1894
 - *larvatus* (Christ, 1791)
 - *tristis* (Gravenhorst, 1829)
- Goedartiini* Townes, 1961
- Goedartia* Boie, 1841
 - Automalus* Wesmael, 1845
 - *alboguttata* (Gravenhorst, 1829)
- Heresiarchini* Ashmead, 1900

- Amblyjoppa* Cameron, 1902
Hadrojoppa Cameron, 1902
– *fuscipennis* (Wesmael, 1945)
– *proteus* (Christ, 1791)
Ichneumon proteus Christ, 1791
Catadelphus Wesmael, 1854
Ichneumon arrogator Fabricius, 1781
– *arrogator* (Fabricius, 1781)
Coelichneumon Thomson, 1893
Ichneumon comitator Linnaeus, 1758
Coelichneumon (Coelichneumon) Thomson, 1893
Cyanojoppa Cameron, 1902
– *albicillus* (Gravenhorst, 1820)
– *biannulatus* (Gravenhorst, 1820)
– *biguttulatus* (Kriechbaumer, 1875)
– *bilineatus* (Gmelin, 1790)
– *bodmanorum* Heinrich, 1950
– *bohemani* (Holmgren, 1864)
– *castaniventris* (Gravenhorst, 1829)
– *citrinops* Wesmael, 1945
– *coactus* (Thomson, 1893)
– *comitator* (Linnaeus, 1758)
– *consimilis* (Wesmael, 1945)
– *cretatus* (Gravenhorst, 1820)
– *cyaniventris* (Wesmael, 1859)
– *decrescens* (Thomson, 1886)
– *deliratorius* (Linnaeus, 1758)
– *desinatorius* (Thunberg, 1822)
– *desultorius* (Wesmael, 1948)
– *dorsosignatus* (Berthoumieu, 1894)
– *dubius* (Wesmael, 1876)
– *eversmani* (Berthoumieu, 1894)
– *falsificus* (Wesmael, 1945)
– *haemorrhoidalis* (Gravenhorst, 1820)
– *leucocerus* (Gravenhorst, 1820)
– *microstictus* (Gravenhorst, 1829)
– *nigerrimus* (Stephens, 1835)
– *nigricornis* (Wesmael, 1945)
– *nobilis* (Wesmael, 1957)
– *opulentus* (Taschenberg, 1871)
– *orbitator* (Thunberg, 1822)
– *percursors* (Tischbein, 1876)
– *pumilionobilis* Heinrich, 1951
– *quadriannulatus* (Gravenhorst, 1829)
– *rudis* (Fonscolombe, 1847)
– *ruficauda* (Wesmael, 1945)
- *serenus* (Gravenhorst, 1820)
– *sinister* (Wesmael, 1948)
– *subviolaceiventris* (Pic, 1908)
– *sugillatorius* (Linnaeus, 1758)
– *tentator* (Wesmael, 1857)
Heresiarches Wesmael, 1859
Miojoppa Cameron, 1902
– *eodoxius* (Wesmael, 1845)
Lymantrichneumon Heinrich, 1968
Sphex disparis Poda, 1761
– *disparis* (Poda, 1761)
– var. *monachae* (Heinrich, 1930)¹⁵
Protichneumon Thomson, 1893
Ichneumon fusorius (Linnaeus, 1761)
– *fusorius* (Linnaeus, 1761)
– *jesperi* (Holmgren, 1886)
– *pisorius* (Linnaeus, 1758)
– *similatorius* (Fabricius, 1798)
Syspasis Townes, 1965
Ichneumon scutellator Gravenhorst, 1829
– *albiguttata* (Gravenhorst, 1820)
– *eburnifrons* (Wesmael, 1857)
– *haesitator* (Wesmael, 1945)
– *helleri* (Holmgren, 1878)
– *leucolomia* (Gravenhorst, 1829)
– *lineator* (Fabricius, 1781)
– *rufina* (Gravenhorst, 1820)
– *scutellator* (Gravenhorst, 1829)
– *tauma* (Heinrich, 1951)
- Ichneumonini* Latreille, 1802
- Achaius* Cameron, 1903
Haliphera Cameron, 1903
– *margineguttatus* (Gravenhorst, 1829)
– *oratorius* (Fabricius, 1793)
Ichneumon oratorius Fabricius, 1793
- Acolobus* Wesmael, 1945
– *albimanus* (Gravenhorst, 1829)
– *sericeus* (Wesmael, 1945)
- Amblyteles* Wesmael, 1945
Ichneumon armatorius Foerster, 1771
– ? *armatorius* (Foerster, 1771)
– ? *aterimus* Brischke, 1862
– ? *nitidus* Brischke, 1862
- Anisopygus* Kriechbaumer, 1888
Ichneumon pseudonymus Wesmael, 1945

- *pseudonymus* (Wesmael, 1945)
- Aoplus* Tischbein, 1874
 - *Trachichneumon* Viereck, 1912
- *altercator* (Wesmael, 1855)
 - Ichneumon altercator* Wesmael, 1855
- *castaneus* (Gravenhorst, 1829)
- *defraudator* (Wesmael, 1944)
- *lugubris* Berthoumieu, 1896
- *ochropis* (Gmelin, 1790)
- *personatus* (Gravenhorst, 1829)
- *rubricosus* (Holmgren, 1864)
 - Ichneumon rubricosus* Holmgren, 1864
- *ruficeps* (Gravenhorst, 1829)
- *sphinx* Heinrich, 1949
- *torpidus* Wesmael, 1857
- Auritus* Constantineanu, 1969
- *elephans* (Brauns, 1896)
 - Ichneumon elephans* Brauns, 1896
- Baranisobas* Heinrich, 1972
 - Ichneumon ridibundus* Gravenhorst, 1829
- *ridibundus* (Gravenhorst, 1829)
- Barichneumon* Thomson, 1893
 - Ichneumon anator* Fabricius, 1793
 - Harsaces* Cameron, 1903
 - *albicaudatus* (Fonscolombe, 1847)
 - *amabilis* Habermehl, 1917
 - *anator* (Fabricius, 1793)
 - *basiglyptus* (Kriechbaumer, 1973)
 - *bilunulatus* (Gravenhorst, 1829)
 - *chionomus* (Wesmael, 1945)
 - *comis* (Wesmael, 1857)
 - *condecoratus* (Gravenhorst, 1829)
 - *derogator* (Wesmael, 1945)
 - *fumipennis* (Gravenhorst, 1829)
 - *gemellus* (Gravenhorst, 1829)
 - *heracliana* Bridgman, 1884
 - *lancea* (Dalla Torre, 1901)
 - *lituratae* (Hartig, 1838)
 - *lunuliger* (Kriechbaumer, 1890)
 - *microcerus* (Gravenhorst, 1829)
 - *nubilis* (Brischke, 1891)
 - *peregrinator* (Linnaeus, 1758)
 - *perversus* (Kriechbaumer, 1893)
 - *plagiarius* (Wesmael, 1948)
 - *praeceptor* (Thunberg, 1822)
 - *quadriguttatus* (Gravenhorst, 1829)
 - *rhenanus* (Habermehl, 1916)
- *saturatorius* (Linnaeus, 1758)
- *sedulus* (Gravenhorst, 1820)
- *sexalbatus* (Gravenhorst, 1820)
 - Ichneumon* Gravenhorst, 1820
- *tibialis* (Brischke, 1878)
- Bureschias* Heinrich, 1936
- *subcylindricus* (Gravenhorst, 1829)
- *tuberosus* (Berthoumieu, 1896)
- Chasmias* Ashmead, 1900
 - Chasmodes* Wesmael, 1845
- *lugens* (Gravenhorst, 1829)
- *motatorius* (Fabricius, 1775)
- *paludator* (Desvignes, 1854)
- Cratichneumon* Thomson, 1893⁶
 - Leptothecus* Cameron, 1903
 - *albifrons* (Stephens, 1835)
 - *albiscuta* (Thomson, 1893)
 - *amoenus* Habermehl, 1916
 - *armillatops* (Rasnitsyn, 1981)
 - *clarigator* (Wesmael, 1945)
 - *coruscator* (Linnaeus, 1758)
 - *culex* (Müller, 1776)
 - Ichneumon culex* Müller, 1776
 - *dissimilis* (Gravenhorst, 1829)
 - *fabricator* (Fabricius, 1793)
 - *fugitivus* (Gravenhorst, 1829)
 - *infidus* (Wesmael, 1948)
 - *jocularis* (Wesmael, 1948)
 - *luteiventris* (Gravenhorst, 1820)
 - Ichneumon luteiventris* Gravenhorst, 1820
 - *pallitarsis* (Thomson, 1887)
 - *pratincola* Heinrich, 1952
 - *rufifrons* (Gravenhorst, 1829)
 - *semirufus* (Gravenhorst, 1820)
 - *sicarius* (Gravenhorst, 1829)
 - *versator* (Thunberg, 1822)
 - *viator* (Scopoli, 1763)
 - Ichneumon viator* Scopoli, 1763
- Crypteffigies* Heinrich, 1961
 - Cratichneumon confusus* Ashmead, 1902
- *albilarvatus* (Gravenhorst, 1820)
- *lanius* (Gravenhorst, 1829)
- *pseudocryptus* (Wesmael, 1857)
- *tenuicinctus* (Schmiedeknecht, 1928)
- Crytea* Cameron, 1906
 - Neocratichneumon* Heinrich, 1938
- *sanguinator* (Rossi, 1794)

- Ctenichneumon* Thomson, 1894
 – *Dachyteles* Berthoumieu, 1904
 – *castigator* (Fabricius, 1793)
 Ichneumon castigator Fabricius, 1793
 – *devylderi* Holmgren, 1871
 Amblyteles devylderi Holmgren, 1871
 – *divisorius* (Gravenhorst, 1820)
 – *edictorius* (Linnaeus, 1758)
 – *funereus* (Geoffroy, 1785)
 Ichneumon funereus Geoffroy, 1785
 – *inspector* (Wesmael, 1945)
 Amblyteles inspector Wesmael, 1945
 – *melanocastanus* (Gravenhorst, 1829)
 – *messorius* (Gravenhorst, 1820)
 Ichneumon messorius Gravenhorst, 1820
 – *nitens* (Christ, 1791)
 – *panzeri* (Wesmael, 1945)
Deuterolabops Heinrich, 1975
 Ichneumon pulchellatus Bridgman, 1884
 – *eupitheciae* (Brischke, 1878)
 Ichneumon pulchellatus Bridgman, 1884
Diphyus Kriechbaumer, 1890
 Pseudamblyteles Ashmead, 1900
 – *amatorius* (Müller, 1776)
 – *f. immarginatus* Habermehl, 1917
 – *bicingulatus* (Gravenhorst, 1829)
 Ichneumon bicingulatus Gravenhorst, 1829
 – *castanopygus* (Stephens, 1835)
 – *efferus* (Wesmael, 1854)
 – *fossorius* (Linnaeus, 1758)
 – *gradatorius* (Thunberg, 1822)
 Ichneumon gradatorius Thunberg, 1822
 – *indocilis* (Wesmael, 1845)
 – *inopinus* Heinrich, 1972
 – *latebricola* (Wesmael, 1845)
 Amblyteles latebricola Wesmael, 1845
 – *longigena* (Thomson, 1888)
 – *luctatorius* (Linnaeus, 1758)
 – *mercatorius* (Fabricius, 1793)
 – *monitorius* (Panzer, 1801)
 – *montivagans* (Bertoumieu, 1897)
 – *ochromelas* (Gmelin, 1790)
 – *palliatorius* (Gravenhorst, 1829)
 – *pandur* (Kriechbaumer, 1882)
 – *pseudomercator* Heinrich, 1978
 – *quadripunctarius* (Müller, 1776)
 – *raptorius* (Linnaeus, 1758)
 – *restitutor* (Wesmael, 1859)
- *septemguttatus* (Gravenhorst, 1829)
 – *tricolor* Kriechbaumer, 1890
 – *trifasciatus* (Gravenhorst, 1829)
 Ichneumon triangulator Stephens, 1835
Eristicus Wesmael, 1945
 Ichneumon clericus Gravenhorst, 1829
 – *clarigator* (Wesmael, 1945)
 – *clericus* (Gravenhorst, 1829)
Eupalamus Wesmael, 1945
 Lagenesta Cameron, 1901
 – *lacteator* (Gravenhorst, 1829)
 – *lamentator* Thunberg, 1822
 – *oscillator* Wesmael, 1945
 – *wesmaeli* Thomson, 1873
Eutanyacra Cameron, 1903
 – *crispatoria* (Linnaeus, 1758)
 – *glaucatoria* (Fabricius, 1793)
 Ichneumon glaucatorius Fabricius, 1793
 – *pallidicornis* (Gravenhorst, 1829)
 – *picta* (Schrank, 1776)
 Ichneumon pictus Schrank, 1776
 – *succincta* (Brullé, 1846)
Exephanes Wesmael, 1945
 Ichneumon hilaris Gravenhorst, 1829
 – *caelebs* Kriechbaumer, 1890
 – *calamagrostidis* Heinrich, 1950
 – *fulvescens* Vollenhoven, 1875
 – *hoerhammeri* (Heinrich, 1949)
 – *ischioxanthus* (Gravenhorst, 1828)
 Ichneumon hilaris Gravenhorst, 1829
 Ichneumon exulans Gravenhorst, 1829
 – *occupator* (Gravenhorst, 1829)
 – *ulbrichti* (Hinz, 1957)
Hepiopelmus Wesmael, 1945
 Ichneumon eucostigmus Gravenhorst, 1829
 – *melanogaster* (Gmelin, 1790)
 Ichneumon melanogaster Gmelin, 1790
 – *variegatorius* (Panzer, 1805)
Homotherus Foerster, 1869
 Ichneumon locutor Thunberg, 1822
 – *berthoumieu* (Pic, 1899)
 – *locutor* (Thunberg, 1822)
 – *magus* (Wesmael, 1955)
 – *varipes* (Gravenhorst, 1829)
Hoplismenus Gravenhorst, 1829
 Peritaenius Foerster, 1869
 – *axillatorius* (Thunberg, 1822)
 – *bidentatus* (Gmelin, 1790)

- *bispinotorius* (Thunberg, 1822)
- *lamprolabus* (Wesmael, 1857)
- *pica* (Wesmael, 1855)
- *terrificus* (Wesmael, 1948)
- Hybophorellus* Schulz, 1911
 - Hybophorus* Tischbein, 1875
- *aulicus* (Gravenhorst, 1829)
- *injucundus* (Wesmael, 1854)
- Ichneumon* Linnaeus, 1758
 - Brachypterus* Gravenhorst, 1829
 - Pterocormus* Foerster, 1850
- ? *abieticola* Ratzeburg, 1852
- ? *acetimuscorum* Christ, 1791
- ? *acicularis* Geoffroy, 1785
- *albiger* (Wesmael, 1945)
- *albiornatus* (Tischbein, 1879)
- *alius* Tischbein, 1879
- *amphibolus* Kriechbaumer, 1888
- *analis* (Gravenhorst, 1829)
- *analisorius* Heinrich, 1952
- *balteatus* (Wesmael, 1845)
- *bellipes* (Wesmael, 1845)
- *bicolor* Villers, 1789
- *bucculentus* (Wesmael, 1845)
- *buryas* Heinrich, 1949
- *caedator* (Gravenhorst, 1829)
- *caloscelis* (Wesmael, 1845)
- *capriolus* Hilpert, 1992
- *cerebrosus* (Wesmael, 1859)
- *cerinthius* (Gravenhorst, 1820)
- *cessator* (Müller, 1776)
- *computatorius* (Müller, 1776)
- *confusor* (Gravenhorst, 1829)
- *coniger* (Tischbein, 1876)
- *crassifemur* (Thomson, 1886)
- *criticus* Tischbein, 1881
- ? *croceatorius* Villers, 1789
- *curtulus* (Kriechbaumer, 1882)
- ? *curtus* Schrank, 1781
- *cynthiae* (Kriechbaumer, 1888)
- *delator* (Wesmael, 1845)
- *depressus* (Gmelin, 1790)
- *didymus* (Gravenhorst, 1829)
- ? *dimidiator* Fabricius, 1781
- ? *diversicolor* Gmelin, 1790
- *dolosus* (Wesmael, 1855)
- *emancipatus* (Wesmael, 1845)
- *eremitatorius* Zetterstedt, 1838
- *eumerus* (Wesmael, 1857)
- *exilicornis* (Wesmael, 1857)
- *extensorius* (Linnaeus, 1758)
- *factor* (Dalla Tore, 1901)
- *fasciator* Fabricius, 1781
- *filatus* (Tischbein, 1879)
- *flavoclypeatus* Pfeffer, 1913
- *formosus* (Gravenhorst, 1829)
- *freyi* (Kriechbaumer, 1880)
- *fulvicornis* Gravenhorst, 1829
- *fuscatus* (Gravenhorst, 1790)
- *gracilentus* (Wesmael, 1845)
- *gracilicornis* (Gravenhorst, 1829)
- *grandicornis* Thomson, 1886
- *gratus* (Wesmael, 1855)
- *guttatus* HTischbein, 1873
- *haematonotus* Wesmael, 1859
- *haemorrhoicus* (Kriechbaumer, 1887)
- *haeselbarthi* Heinrich, 1973
- *haglundii* (Holmgren, 1864)
- *helleni* Heinrich, 1951
- *hinzi* Heinrich, 1972
- *hypolius* (Thomson, 1888)
- *ignobilis* (Wesmael, 1855)
- *ingratus* Hellén, 1951
- *inops* (Holmgren, 1880)
- *inquinatus* (Wesmael, 1845)
- *insidiosus* (Wesmael, 1845)
- *jugicola* (Heinrich, 1949)
- *languidus* (Wesmael, 1845)
- *latrator* (Fabricius, 1781)
- *lautatorius* Desvignes, 1856
- *leucopeltis* Thomson, 1888
- *ligatorius* (Thunberg, 1822)
- *luteipes* (Wesmael, 1855)
- *manicatus* Holmgren, 1864
- *megapodius* (Heinrich, 1949)
- *melanobatus* (Gravenhorst, 1829)
- *melanopygus* Wesmael, 1855
- *melanosomus* Wesmael, 1855
- *melanotis* (Holmgren, 1864)
- ? *melanurus* Gmelin, 1790
- *memorator* (Wesmael, 1845)
- *micropnygus* (Thomson, 1893)

- ? *militator* Cuvie, 1833
- *minutorius* (Desvignes, 1856)
- *molitorius* (Linnaeus, 1761)
- *monospilus* Thomson, 1896
- *mordax* Kriechbaumer, 1875
- *multipictus* Gravenhorst, 1820
- *nebulosae* Hinz, 1975
- *nigritus* Olivier, 1792
- *novemalbatus* Kriechbaumer, 1875
- *obliteratus* (Wesmael, 1855)
- *obscuritarsis* (Dalla Tarre, 1902)
- *observandus* Heinrich, 1951
- *oviventroides* Hinz, 1975
- ? *palpator* Kawal, 1868
- *pheostigmus* (Wesmael, 1857)
- *pinguicornis* Bauer, 1985
- *polyxanthus* (Kriechbaumer, 1869)
- *porcellus* Hilpert, 1992
- *primatorius* (Foerster, 1771)
- *proletarius* (Wesmael, 1945)
- *pseudocaloscelis* Heinrich, 1949
- *pulvinatus* Kriechbaumer, 1874
- ? *punctator* Thunberg, 1822
- ? *punc torius* Müller, 1776
- ? *punctulatus* Pfeffer, 1913
- *pygolissus* Heinrich, 1951
- *quadrialbatus* (Gravenhorst, 1820)
- *quadrianellatus* (Thomson, 1893)
- *quaesitorius* (Linnaeus, 1761)
- *quiquealbatus* (Kriechbaumer, 1890)
- ? *raptor* Müller, 1776
- ? *resinanae* Ratzeburg, 1852
- *rogenhoferops* Heinrich, 1980
- ? *rubicundus* Geoffroy, 1785
- *rufigena* Kriechbaumer, 1875
- *quinquealbatus* (Kriechbaumer, 1890)
- *ruttneri* Heinrich, 1944
- *sarcitorius* (Linnaeus, 1758)
- *sculpturatus* Holmgren, 1864
- *semiorbitalis* Gravenhorst, 1820
- *sexcinctus* Gravenhorst, 1829
- *signaticornis* Kriechbaumer, 1893
- *silaceus* (Gravenhorst, 1829)
- *simulans* Tischbein, 1873
- *spurius* (Wesmael, 1945)
- *stigmatorius* (Zetterstedt, 1838)
- *stramentor* Rasnitsyn, 1981
- *subalpinus* Holmgren, 1864
- *subannulatus* Gravenhorst, 1820
- *submarginatus* (Gravenhorst, 1829)
- *subobsoletus* Tischbein, 1882
- ? *sulphurreus* Gmelin, 1790
- *suspiciosus* (Wesmael, 1845)
- *suturalis* Holmgren, 1864
- *terminatorius* (Gravenhorst, 1829)
- *thomsoni* Holmgren, 1864
- *trialbatus* Kriechbaumer, 1880
- *tuberculipes* (Wesmael, 1945)
- ? *unicolor* Gmelin, 1790
- ? *ustulatus* Gmelin, 1790
- *vafer* (Tischbein, 1876)
- *validicornis* (Holmgren, 1864)
- ? *varius* Gmelin, 1790
- *veressi* Kiss, 1915
- *vorax* (Geoffroy, 1785)
- *vulneratorius* (Zetterstedt, 1938)
- ? *xanthomelas* Gmelin, 1790
- *xanthorius* (Foerster, 1771)
- Limerodes* Wesmael, 1845
- *arctiventris* (SchiØdte, 1839)
- Limerodops* Heinrich, 1949
- Eurylabus elongatus* Brischke, 1865
- Ischnus unilineatus* Gravenhorst, 1829
- *elongatus* (Brischke, 1865)
- *subsericans* (Gravenhorst, 1820)
- *unilineatus* (Gravenhorst, 1829)
- Melanichneumon* Thomson, 1893
- Ichneumon spectabilis* Holmgren, 1864
- *albipictus* (Gravenhorst, 1820)
 - Ichneumon albipictus* Gravenhorst, 1820
- *designatorius* (Linnaeus, 1758)
- *glaucatoriops* Heinrich, 1972
- *leucocheilus* (Wesmael, 1945)
- *melanarius* (Wesmael, 1945)
- *spectabilis* (Holmgren, 1864)
 - Ichneumon spectabilis* Holmgren, 1864
- *sexarmillatus* (Kriechbaumer, 1891)
- *sexguttatus* (Kriechbaumer, 1894)
- Neischnus* Heinrich, 1952
- *oxypygus* Heinrich, 1952
- Obtusodonta* Heinrich, 1962
- Spilichneumon obscuricolor* Heinrich, 1961

- *equitatoria* (Panzer, 1786)
- Orgichneumon* Heinrich, 1961
 - Ichneumon calcatorius* Thunberg, 1822
 - *calcatorius* (Thunberg, 1822)
 - Paracoelichneumon* Heinrich, 1978
 - *cataloniensis* Heinrich, 1978
 - *rubens* (Fonscolombe, 1847)
 - Patrocloides* Heinrich, 1961
 - *cearei* (Heinrich, 1949)
 - *chalybeatus* (Gravenhorst, 1829)
 - Ichneumon chalybeatus* Gravenhorst, 1829
 - *diasemae* (Tischbein, 1877)
 - *lapponicus* (Holmgren, 1871)
 - *sputator* (Fabricius, 1793)
 - Ichneumon sputator* Fabricius, 1793
 - Platylabops* Heinrich, 1950
 - Ichneumon apricus* Gravenhorst, 1820
 - *apricus* (Gravenhorst, 1820)
 - *cornicula* (Wesmael, 1855)
 - *haematomerus* Holmgren, 1878
 - *hinzi* Heinrich, 1950
 - *humilis* (Wesmael, 1857)
 - *lariciatae* (Kriechbaumer, 1890)
 - *speciosus* (Wesmael, 1845)
 - *virginalis* (Wesmael, 1845)
 - Probolus* Wesmael, 1845
 - *alticola* (Gravenhorst, 1820)
 - *concinnus* (Wesmael, 1853)
 - *culpatorius* (Linnaeus, 1758)
 - Pseudoamblyteles* Heinrich, 1926
 - Amblyteles homocerus* Wesmael, 1854
 - *homocerus* (Wesmael, 1854)
 - var. *noskiewiczi* (Heinrich, 1926)
 - Rhadinodonda* Szépligeti, 1908
 - *flaviger* (Wesmael, 1945)
 - *rufidens* (Wesmael, 1945)
 - Rhysaspis* Tischbein, 1874
 - *rugosus* (Tischbein, 1874)
 - Rictichneumon* Heinrich, 1961
 - Ichneumon residuus* Say, 1829
 - *pachymerus* (Hartig, 1838)
 - Spilichneumon* Thomson, 1894
 - Ichneumon occisorius* Fabricius, 1793
 - Spiloteles* Berthoumieu, 1904
 - *ammonius* (Gravenhorst, 1820)
 - *anurus* (Thomson, 1888)
 - *celenae* Perkins, 1953
 - *johansoni* (Holmgren, 1871)
 - *limnophilus* (Thomson, 1888)
 - *nigrifrons* (Holmgren, 1878)
 - *occisorius* (Fabricius, 1793)
 - *pici* (Berthoumieu, 1894)
 - *podolicus* (Heinrich, 1936)
 - Spilothyrateles* Heinrich, 1967
 - Ichneumon fabricii* Schrank, 1802
 - *fabricii* (Schrank, 1802)
 - *illuminatorius* (Gravenhorst, 1820)
 - *punctus* (Gravenhorst, 1829)
 - Stenaoplus* Heinrich, 1938
 - *pictus* (Gravenhorst, 1829)
 - Stenichneumon* Thomson, 1893
 - Ichneumon pistorius* Gravenhorst, 1829
 - Myeromo* Cameron, 1901
 - *alpicola* (Kriechbaumer, 1872)
 - *culpator* (Schrank, 1802)
 - Ichneumon culpator* Schrank, 1802
 - *devergentis* (Bauer, 1941)
 - *dubitatorius* Sulzer, 1776
 - *inexpectatus* Heinrich, 1936
 - *militarius* (Thunberg, 1822)
 - *ringii* (Holmgren, 1884)
 - *seticornis* (Tischbein, 1868)
 - Stenobarichneumon* Heinrich, 1961
 - Ichneumon citator* Thunberg, 1822
 - *basalis* (Perkins, 1960)
 - *basiglyptus* (Kriechbaumer, 1890)
 - *citator* (Thunberg, 1822)
 - *protervus* (Holmgren, 1864)
 - *pygmaeus* (Habermehl, 1925)
 - *tegelensis* (Heinrich, 1951)
 - Thryateles* Perkins, 1953
 - Amblyteles camelinus* Wesmael, 1945
 - *camelinus* (Wesmael, 1945)
 - *haereticus* (Wesmael, 1945)
 - *tardus* Berthoumieu, 1899
 - Tricholabus* Thomson, 1894
 - Platylabus femoralis* Thomson, 1894
 - Opiopelmidea* Viereck, 1913
 - *femoralis* (Thomson, 1894)
 - *strigatorius* (Gravenhorst, 1829)
 - Triptognathus* Berthoumieu, 1904
 - Ichneumon uniguttatus* Gravenhorst, 1829
 - *atrides* (Gravenhorst, 1820)
 - Ichneumon uniguttatus* Gravenhorst, 1829
 - *bolivari* (Berthoumieu, 1894)

- *fumigator* (Gravenhorst, 1820)
 - *luteomaculatus* (Pic, 1899)
 - *sibilans* (Gravenhorst, 1829)
 - *subalpinus* Heinrich, 1949
 - Ulestoides* Cameron, 1903
 - *perspicua* (Wesmael, 1857)
 - Virgichneumon* Heinrich, 1977
 - Ichneumon zebratus* Cresson, 1867
 - *albilineatus* (Gravenhorst, 1820)
 - Ichneumon leucomelas* Gmelin, 1790
 - *albosignatus* (Gravenhorst, 1829)
 - Ichneumon mesostilpnus* Thomson, 1888
 - *callicerus* (Gravenhorst, 1820)
 - *digrammus* (Gravenhorst, 1820)
 - *distincticornis* (Schmiedeknecht, 1928)
 - *dumeticola* (Gravenhorst, 1829)
 - *extremator* (Thunberg, 1822)
 - *faunus* (Gravenhorst, 1829)
 - *krapinensis* (Schmiedeknecht, 1928)
 - *maculicauda* (Perkins, 1853)
 - *monostagon* (Gravenhorst, 1820)
 - *tenuicornis* Heinrich, 1930
 - *tergenus* (Gravenhorst, 1820)
 - Vulgichneumon* Heinrich, 1961
 - Ichneumon brevicinctus* Say, 1825
 - *bimaculatus* (Schränk, 1776)
 - *deceptor* (Scopoli, 1763)
 - *saturatorius* (Linnaeus, 1758)
 - *suavis* (Gravenhorst, 1820)
 - *trifarius* (Berthoumieu, 1892)
 - Zanthojoppa* Cameron, 1901
 - Xanthojoppa* Cameron, 1901
 - *lutea* (Gravenhorst, 1829)
- Joppocryptini* Viereck, 1918
- Pseudoplatylabus* Smits van Burgst, 1920
 - *uniguttatus* (Gravenhorst, 1829)
 - *violentus* (Gravenhorst, 1829)
- Listrodromini* Foerster, 1869
- Anisobas* Wesmael, 1845
 - Ichneumon cingulatorius* Gravenhorst, 1820
 - Lycaeniphilus* Heinrich, 1934
 - *brombacheri* (Heinrich, 1933)
 - *hostilis* (Gravenhorst, 1820)
- *jugorum* (Heinrich, 1949)
- *platystylus* Thomson, 1888
- Listrodromus* Wesmael, 1845
 - Ichneumon nycthemerus* Gravenhorst, 1820
 - Sogna* Cameron, 1907
- *nycthemerus* (Gravenhorst, 1820)
- Neotypus* Foerster, 1869
 - Ichneumon lapidator* Fabricius, 1793
 - Cillimus* Tosquinet, 1896
 - *pusillus* (Gregor, 1940)
- Oedicephalini* Heinrich, 1934
- Notosemus* Foerster, 1869
 - Ischnogaster albibucca* Kriechbaumer, 1890
 - Ischnidium* Kriechbaumer, 1890
 - *bohemani* (Wesmael, 1855)
- Platylabini* Berthoumieu, 1904
- Apaeleticus* Wesmael, 1845
 - *bellicosus* (Wesmael, 1845)
 - *inimicus* (Gravenhorst, 1820)
 - *mesostictus* (Gravenhorst, 1829)
- Asthenaolabus* Heinrich, 1951
 - Stenolabus* Heinrich, 1936
 - *daemon* (Wesmael, 1845)
 - *laiscapus* (Thomson, 1894)
 - *mesoleucus* (Heinrich, 1936)
 - *stalii* (Holmgren, 1871)
 - *sternoleucus* (Wesmael, 1853)
 - *vitratorius* (Gravenhorst, 1829)
- Cyclolabus* Heinrich, 1936
 - Platylabus nigricollis* Wesmael, 1845
 - *dubiosus* (Perkins, 1953)
 - *nigricollis* (Wesmael, 1845)
 - *pactor* (Wesmael, 1845)
- Dentilabus* Heinrich, 1974
 - Platylabus variegatus* Wesmael, 1845
 - *variegatus* (Wesmael, 1845)
- Ectopius* Wesmael, 1859
 - Ichneumon rubellus* Gmelin, 1790
 - *picturatus* (Lange, 1911)
 - *rubellus* (Gmelin, 1790)
- Ectopoides* Heinrich, 1951
 - *brevicornis* (Kriechbaumer, 1890)
 - *detritus* (Holmgren, 1878)
- Hypomecus* Wesmael, 1845

- *quadriannulatus* (Gravenhorst, 1829)
Linycus Cameron, 1903
 Erythroischnus Cameron, 1904
 – *exhortator* (Fabricius, 1787)
 Ichneumon exhortator Fabricius, 1787
 – *flavitarsis* (Heinrich, 1937)
Notoplatylabus Heinrich, 1936
 – *podolicus* Heinrich, 1936
Platylabus Wesmael, 1845
 Platylabus rufus Wesmael, 1845
 Lamprojoppa Cameron, 1901
 – *auriculatus* Kriechbaumer, 1890
 – *borealis* Holmgren, 1971
 – *concinnus* Thomson, 1888
 – *decipiens* (Wesmael, 1945)
 – *dolorosus* (Gravenhorst, 1829)
 – *eurygaster* Holmgren, 1871
 – *fugator* (Gravenhorst, 1807)
 – *gigas* Kriechbaumer, 1886
 – *histrio* (Wesmael, 1955)
 – *intermedius* Holmgren, 1871
 – *iridipennis* (Gravenhorst, 1829)
 – *muticus* Thomson, 1894
 – *nigrocyaneus* (Gravenhorst, 1829)
 – *odiosus* Perkins, 1953
 – *oehlkei* Heinrich, 1972
 – *opaculus* Thomson, 1888
 – *pallidens* (Holmgren, 1953)
 – *pedatorius* (Fabricius, 1793)
 – *pumilio* Holmgren, 1971
 – *punctifrons* Thomson, 1888
 – *rufiventris* (Wesmael, 1845)
 – *rufus* (Wesmael, 1845)
 – *silesiacus* (Habermehl, 1920)
 – *stolidus* Perkins, 1953-
 – *tenuicornis* (Gravenhorst, 1829)
 – *transversus* (Bridgman, 1889)
 – *uranius* Dalman, 1823
 – *vibratorius* (Thunberg, 1822)
 – *volubilis* (Gravenhorst, 1829)
Poecilostictus Ratzeburg, 1852
 Neoplatylabus Heinrich, 1936
 – *cothurnatus* (Gravenhorst, 1829)
Pristicerops Heinrich, 1961
 Platylabus bakeri Davis, 1898
 – *infractorius* (Linnaeus, 1761)
 – *laetepictus* (Costa, 1863)
- *larvator* (Gravenhorst, 1829)
Pristiceros Gravenhorst, 1829
Neopristicerops Heinrich, 1961
 – *serrarius* Gravenhorst, 1829
Pyramidophorus Tischbein, 1882
 – *flavoguttatus* Tischbein, 1882
Zimmeriini Heinrich, 1934
- Cotiheresiarches* (Telenga, 1929)
 Zimmeria Heinrich, 1934
 – *dirus* (Wesmael, 1853)
 Eurylabus dirus Wesmael, 1853
- Lycorininae* Cushman & Rohwer, 1920
- Lycorina* Holmgren, 1859
 Taxophoroides Cresson, 1893
 Gonioglyphus Seyrig, 1932
 – *triangulifera* (Holmgren, 1859)
- Mesochorinae* Foerster, 1869
- Astiphromma* Foerster, 1869
 Astiphromma Thomson, 1869
 Dolichochorus Strobl, 1904
 – *albitarse* (Brischke, 1880)
 – *anale* (Holmgren, 1860)
 – *dorsale* (Holmgren, 1860)
 – *granigerum* (Thomson, 1886)
 – *mandibulare* (Thomson, 1886)
 – *marginellum* (Holmgren, 1860)
 – *nigrum* Pfankuch, 1921
 – *pictum* (Brischke, 1880)
 – *plagiatum* (Thomson, 1885)
 – *rufipes* (Brischke, 1880)
 – *scutellatum* (Gravenhorst, 1829)
 – *striatum* (Brischke, 1880)
 – *varipes* (Holmgren, 1860)
Cidaphus Foerster, 1869
 Plesiophthqalmus Foerster, 1869
 – *alarius* (Gravenhorst, 1829)
 – *atricilla* (Haliday, 1839)
Mesochorus Gravenhorst, 1829
 Stictopistus Thomson, 1886
 Edrisa Cameron, 1907
 – *agilis* (Cresson, 1865)

- *anomalus* (Holmgren, 1860)
 - *bilineatus* Thomson, 1886
 - *brevicollis* (Thomson, 1886)
 - *brevipetiolatus* (Ratzeburg, 1844)
 - *complanatus* (Haliday, 1839)
 - *confusus* Holmgren, 1860
 - *curvicauda* Thomson, 1886
 - *curvulus* (Thomson, 1886)
 - *discitergus* (Sey, 1835)
 - *femoralis* Brischke, 1880
 - *fulgurans* (Curtis, 1833)
 - *fulvus* Thomson, 1886
 - *fuscicornis* Brischke, 1880
 - *giberius* (Thunberg, 1822)
 - *longicauda* Thomson, 1886
 - *marginatus* Thomson, 1886
 - *nigripes* (Ratzeburg, 1852)
 - *ocellatus* Brischke, 1880
 - *orbitalis* Holmgren, 1860
 - *pallipes* Brischke, 1880
 - *pectoralis* (Ratzeburg, 1844)
 - *politus* (Gravenhorst, 1929)
 - *ruficornis* Brischke, 1880
 - *rufoniger* Brischke, 1880
 - *salicis* Thomson, 1886
 - *semirufus* Holmgren, 1860
 - *stigmator* (Thunberg, 1822)
 - *suecicus* (Dalla Torre, 1902)
 - *sylvarum* (Curtis, 1833)
 - *temporalis* Thomson, 1886
 - *testaceus* Gravenhorst, 1829
 - *tetricus* Holmgren, 1860
 - *tuberculiger* Thomson, 1886
 - *velox* Holmgren, 1860
 - *vitticollis* Holmgren, 1860
- Metopiinae Foerster, 1869**
- Chorinaeus* Holmgren, 1858**
 - Exochus funebris* Gravenhorst, 1829
 - Polyrhabdus* Walsh, 1873
 - *australis* (Thomson, 1887)
 - Chorinaeus flavifrons* Schmiedeknecht, 1925
 - *cristator* (Gravenhorst, 1829)
 - *flavipes* Bridgman, 1881
 - *funebris* (Gravenhorst, 1829)
 - Exochus funebris* Gravenhorst, 1829
- *hastianae* Aeschlimann, 1975
 - *longicornis* Thomson, 1887
 - *rhenanus* Aeschlimann, 1981
 - *scrobipalpae* Aeschlimann, 1983
 - *subcarinatus* (Holmgren, 1860)
 - *taetricus* Tolkanitz, 1995
 - *talpa* (Haliday, 1839)
 - Colpotrochia* Holmgren, 1856**
 - Ichneumon elegantulus* Schrank, 1781
 - Exochoides* Cresson, 1868
 - *cincta* (Scopoli, 1763)
 - Drepanoconthus* Pfankuch, 1911**
 - Zonopius* Benoit, 1961
 - *tibialis* Pfankuch, 1911
 - Exochus* Gravenhorst, 1829**
 - Amesolytus* Foerster, 1869
 - Xanthexochus* Morley, 1913
 - *albicinctus* (Holmgren, 1873)
 - *albomarginatus* Szépligeti, 1901
 - *alpinus* (Zetterstedt, 1838)
 - *annulitarsis* Thomson, 1887
 - *carri* Schmiedeknecht, 1924
 - *castaniventris* (Brauns, 1896)
 - *consimilis* (Holmgren, 1858)
 - *coronatus* Gravenhorst, 1829
 - *elegantissimus* Schmiedeknecht, 1924
 - *erythronotus* (Gravenhorst, 1820)
 - Ichneumon erythronotus* Gravenhorst, 1820
 - *flavomarginatus* Holmgren, 1856
 - *foveolatus* (Schmiedeknecht, 1924)
 - *gravipes* (Gravenhorst, 1820)
 - Ichneumon gravipes* Gravenhorst, 1820
 - *gravis* Gravenhorst, 1829
 - *incidens* Thomson, 1887
 - *lentipes* (Gravenhorst, 1829)
 - *lineifrons* Thomson, 1887
 - *mitratus* (Gravenhorst, 1829)
 - affinis* Holmgren, 1858
 - australis* Thomson, 1894
 - paradoxus* Schmiedeknecht, 1924
 - punctifer* Schmiedeknecht, 1924
 - *morianellus* Holmgren, 1858
 - *nigripalpis* Thomon, 1887
 - *notatus* Holmgren, 1858
 - *pictus* Holmgren, 1858
 - *prosopius* (Gravenhorst, 1829)
 - *separandus* Schmiedeknecht, 1924
 - *signatus* Habermehl, 1925

- *suborbitalis* Schmiedeknecht, 1924
- *tardigradus* (Gravenhorst 1829)
- *thomsoni* (Schmiedeknecht, 1924)
- *tibialis* Holmgren, 1858
- *turgidus* (Holmgren, 1858)
- *vafer* Holmgren, 1873
- *ventralis* (Holmgren, 1858)
- Hypsicera* Latreille, 1829
 - Metacoelus* Foerster, 1869
 - *curvator* (Fabricius, 1793)
 - *ecarinata* Tolkanitz, 1986
 - *femoralis* (Geoffroy, 1785)
 - Ichneumon femoralis* Geoffroy, 1785
 - *flaviceps* (Ratzeburg, 1852)
- Ischyrocnemis* Holmgren, 1858
 - Terozoa quadridens* Perkins,
 - *quadridens* Perkins, 1961
- Lapton* Nees, 1816
 - *femoralis* Nees, 1816
- Metopius* Panzer, 1806
 - Sphex vespoides* Scopoli, 1763
- Metopius (Ceratopius)* Clément, 1927
 - Ichneumon dissectorius* anzer, 1805
 - *croaticus* Clément, 1930
 - *curtiventris* (Clément, 1930)
 - *dissectorius* (Panzer, 1805)
 - *fuscipennis* (Wesmael, 1849)
 - *mediterraneus* Clément, 1930
 - *paradoxus* Clément, 1930
 - *scrobicularis* (Hartig, 1838)
 - *similatorius* (Pfankuch, 1914)
- Metopius (Metopius)* Panzer, 1806
 - Sphex vespoides* Scopoli, 1763
 - *anxius* (Wesmael, 1849)
 - *austriacus* Clément, 1930
 - *vespoides* (Scopoli, 1763)
 - Sphex vespoides* Scopoli, 1763
- Metopius (Peltocarus)* Thomson, 1887
 - *croceicornis* Thomson, 1887
 - *dentatus* (Fabricius, 1779)
 - Ichneumon micratorius* Fabricius, 1804
- Metopius (Tylopius)* Townes & Townes, 1959
 - *brevispina* Thomson, 1887
 - *connexorius* (Wesmael, 1849)
 - *leiopygus* (Foerster, 1850)
 - *longispina* (Clément, 1930)
 - *pinatorius* (Brullé, 1846)
- Periope* Haliday, 1839
 - Monoplectron* Holmgren, 1856
 - *auscultator* (Haliday, 1939)
 - *hoerhammeri* (Heinrich, 1949)
 - *longiceps* (Bauer, 1968)
- Spudaeus* Gistel, 1848
 - Trachyderma* Gravenhorst, 1829
 - Trachyderma scabra* Gravenhorst, 1829
- *brevis* Ruthe, 1855
 - *scaber* (Gravenhorst, 1829)
- Stethoncus* Townes & Townes, 1959
 - *sulcator* Aubert, 1963
- Synosis* Townes & Townes, 1959
 - *meridionalis* Tolkanitz, 1977
- Triclistus* Foerster, 1869
 - Exochus podagricus* Gravenhorst, 1829
 - *aethiops* (Gravenhorst, 1829)
 - Exochus aethiops* Gravenhorst, 1829
 - *albicinctus* Thomson, 1887
 - *areolatus* Thomson, 1887
 - *congener* (Holmgren, 1858)
 - *globulipes* (Desvignes, 1856)
 - *lativentris* Thomson, 1887
 - *longicalcar* Thomson, 1887
 - *niger* (Bridgman, 1883)
 - *pallipes* (Holmgren, 1873)
 - *podagricus* (Gravenhorst, 1829)
 - Exochus podagricus* Gravenhorst, 1829
 - *pubiventris* Thomson, 1887
 - *pygmaeus* (Cresson, 1864)
 - *pyrella* Tolkanitz, 1983
 - *spiracularis* (Thomson, 1887)
 - *squalidus* (Holmgren, 1858)
 - *yponomeutae* Aeschlimann, 1973
 - Trieces* Townes, 1946
 - Exochus texanus* Cresson, 1872
 - *dinianae* Aeschlimann, 1973
 - *rufimitranae* Aeschlimann, 1973
 - *thuringiacus* (Schmiedeknecht, 1925)
 - Chorinaeus thuringiacus* Schmiedeknecht, 1925
 - *tricarinatus* (Holmgren, 1858)
 - Microleptinae* Townes, 1961
 - Hyperacmus* Holmgren, 1858
 - Exochus crassicornis* Gravenhorst, 1829
 - Nothaima* Cameron, 1902
 - *crassicornis* (Gravenhorst, 1829)

- Microleptes* Gravenhorst, 1829
Miomeris Foerster, 1869
– *aquisgranensis* (Foerster, 1871)
– *rectangulus* (Thomson, 1888)
Miomeris regius Schmiedeknecht, 1924
– *splendidulus* (Gravenhorst, 1829)
- Neorrhacodinae** Hedicke, 1922
- Neorrhacodes** Hedicke, 1922
Rhacodes Ruschka, 1922
– *enslini* (Ruschka, 1922)
- Ophioninae** Shuckard, 1940
- Enicospilus** Stephens, 1835
Ophion combustus Gravenhorst, 1829
Allocamptus Foerster, 1869
Schizospilus Seyrig, 1935
– *inflexus* (Ratzeburg, 1844)
– *merdarius* (Gravenhorst, 1829)
– *ramidulus* (Linnaeus, 1758)
– *repentinus* (Holmgren, 1860)
– *undulatus* (Gravenhorst, 1829)
– *unicallosus* (Snellen van Vollenhoven, 1878)
- Ophion** Fabricius, 1798
Ichneumonluteus Linnaeus, 1758
Paniscus Schrank, 1802
Mecetron Townes, 1871
– *areolaris* Brauns, 1889
– *brevicornis* Morley, 1915
– *costatus* Ratzeburg, 1848
– *forticornis* Morley, 1915
– *longigena* Thomson, 1888
– *luteus* (Linnaeus, 1758)
Ichneumon distans Thomson, 1888
Ichneumon dispar Brauns, 1895
– *minutus* (Kriechbaumer, 1879)
– *obscuratus* (Fabricius, 1798)
– *ocellaris* Ulbricht, 1926
– *parvulus* Kriechbaumer, 1879
– *pteridis* Kriechbaumer, 1879
– *scutellaris* (Thomson, 1888)
– *ventricosusi* (Gravenhorst, 1829)
- Stauropoctonus** Brauns, 1889
Ophion bombycivorus Gravenhorst, 1829
Aulophion Cushmann, 1947
– *bombycivorus* (Gravenhorst, 1829)
- Orthocentrinae** Foerster, 1869
- Aniseres** Foerster, 1871
– *pallipes* (Foerster, 1871)
Aperileptus Foerster, 1869
Plectiscus albipalpus Gravenhorst, 1829
– *albipalpus* (Gravenhorst, 1923)
– *flavus* (Foerster, 1871)
– *impurus* (Foerster, 1871)
– *infuscatus* Foerster, 1871
– *melanopsis* Foerster, 1871
– *microspilus* (Foerster, 1871)
– *plagiatus* Foerster, 1871
– *vanus* (Foerster, 1871)
– *viduatus* Foerster, 1871
- Apoclima** Foerster, 1869
– *haeselbarthi* Rossem, 1987
– *signaticorne* Foerster, 1881
- Catastenus** Foerster, 1869
– *femoralis* Foerster, 1871
- Eusterinx** Foerster, 1869
Eusterinx (Divinatrix) Rossem, 1987
– *inaequalis* Rossem, 1981
Eusterinx (Eusterinx) Foerster, 1869
– *argutula* (Foerster, 1871)
– *obscurella* (Foerster, 1871)
– *oligomera* (Foerster, 1871)
– *pseudoligomera* Gregor, 1941
– *subdola* (Foerster, 1871)
- Eusterinx (Holomeristus)** Foerster, 1869
Holomeristus tenuicinctus Foerster, 1871
– *tenuicincta* (Foerster, 1871)
- Eusterinx (Trestis)** Foerster, 1869
Trestis tricincta Ashmead, 1902
– *tartarea* Rossem, 1982
– *trichops* (Thomson, 1888)
- Helictes** Haliday, 1837
Ichneumon erythrostoma Gmelin, 1790
M yriarthrus Foerster, 1869
– *borealis* (Holmgren, 1857)
– *erythrostoma* (Gmelin, 1790)
– *fabularis* Rossem, 1987
– *incongruens* Rossem, 1987
- Hemiphanes** Foerster, 1869
– *flavipes* Foerster, 1871
– *gravator* Foerster, 1871
– *performidatum* Rossem, 1988

- Megastylus* (SchiØdte, 1838)
- *Diculus* Foerster, 1869
 - *Miomeroides* Kiss, 1924
 - *aemulus* Foerster, 1871
 - *cruentator* (SchiØdte, 1839)
 - *elegans* Rossem, 1983
 - *excubitor* (Foerster, 1871)
 - *flavopictus* (Gravenhorst, 1829)
 - *impressor* SchiØdte, 1838
 - *orbitator* (SchiØdte, 1838)
 - *pectoralis* (Foerster, 1771)
 - *tenellus* Rossem, 1983
- Neurateles* Ratzeburg, 1848
- *compressus* Thomson, 1897
- Orthocentrus* Gravenhorst, 1829
- *Atmetus* Foerster, 1869
 - *Tapinops* Foerster, 1869
 - *ambiguus* Holmgren, 1858
 - *asper* (Gravenhorst, 1829)
 - *attenuatus* Holmgren, 1858
 - *corrugatus* Holmgren, 1858
 - *frontator* (Zetterstedt, 1838)
 - *fulvipes* (Gravenhorst, 1829)
 - *marginatus* Holmgren, 1858
 - *monicornis* Holmgren, 1858
 - *patulus* Holmgren, 1858
 - *petiolaris* Thomson, 1897
 - *protervus* Holmgren, 1858
 - *rufescens* Brischke, 1871
 - *sannio* Holmgren, 1858
 - *spurius* (Gravenhorst, 1829)
 - *stigmaticus* (Holmgren, 1858)
 - *strigatus* Holmgren, 1858
 - *thomsoni* Roman, 1936
 - ? *tuberculatus* (Brischke, 1891)
- Pantisarthrus* Foerster, 1871
- *lubricus* (Foerster, 1871)
 - *luridus* Foerster, 1871
- Phosphoriana* Rossem, 1987
- *rugosissima* (Strobl, 1904)
- Plectiscidea* Viereck, 1914
- Plectiscidea* (*Fugatrix*) Rossem, 1987
- *Plectiscus communis* Foerster, 1871
 - *communis* (Foerster, 1871)
- Plectiscidea* (*Plectiscidea*) Viereck, 1914
- *bistriata* (Thomson, 1888)
 - *canaliculata* (Foerster, 1871)
- *cinctula* (Foerster, 1871)
 - *collaris* (Gravenhorst, 1829)
 - *crassicornis* (Foerster, 1871)
 - *erythropyga* (Foerster, 1871)
 - *helvola* (Foerster, 1871)
 - *humeralis* (Foerster, 1871)
 - *hyperborea* (Holmgren, 1869)
 - *indomita* van Rossem, 1987
 - *melanocera* (Foerster, 1871)
 - *moerens* (Foerster, 1871)
 - *monticola* (Foerster, 1871)
 - *nava* (Foerster, 1871)
 - *nemorensis* (Rossem, 1987)
 - *posticata* (Foerster, 1871)
 - *substantiva* van Rossem, 1987
 - *tenuicornis* (Foerster, 1871)
 - *terebrator* (Foerster, 1871)
 Fugatrix habilis Foerster, 1871
 - *vagator* (Foerster, 1871)
- Plectiscus* Gravenhorst, 1829
- *Brephoconus* Foerster, 1869
 - *agilis* (Holmgren, 1858)
 - *impurator* (Gravenhorst, 1829)
 - *minutus* (Holmgren, 1858)
- Proclitus* Foerster, 1969
- *Clepticus* Haliday, 1839
 - *albidipes* (Foerster, 1871)
 - *ardentis* Rossem, 1987
 - *attentus* (Foerster, 1871)
 - *comes* (Haliday, 1839)
 - *fulvicornis* (Foerster, 1871)
 - *fulvipectus* (Foerster, 1871)
 - *paganus* (Haliday, 1839)
 - *praetor* (Haliday, 1839)
 - *rudis* (Foerster, 18671)
 - *subsulcatus* Foerster, 1871
 - *zonatus* (Gravenhorst, 1829)
- Stenomacrus* Foerster, 1869
- *Camarotops* Foerster, 1869
 - *bispinus* (Holmgren, 1858)
 - *caudatus* (Holmgren, 1858)
 - *cephalotes* (Holmgren, 1858)
 - *cognatus* (Holmgren, 1858)
 - *curvicaudatus* (Brischke, 18571)
 - *flaviceps* (Gravenhorst, 1829)
 - *hastatus* (Holmgren, 1858)

- *incisus* (Gravenhorst, 1829)
 - *merula* (Gravenhorst, 1829)
 - *minutissimus* (Zetterstedt, 1838)
 - *ochripes* (Holmgren, 1858)
 - *pallipes* (Holmgren, 1858)
 - *palustris* (Holmgren, 1858)
 - *silvaticus* (Holmgren, 1858)
 - *vafer* (Holmgren, 1858)
 - *varius* (Holmgren, 1858)
 - *vitripennis* (Holmgren, 1858)
 - Symplicis* Foerster, 1869
 - Blapticus* Foerster, 1869
 - *beaumontor* Aubert, 1968
 - *bicingulatus* (Gravenhorst, 1829)
 - *breviuscula* (Roman, 1923)
 - *invisitata* Rossem, 1981
- Orthopelmatinae** Schmiedeknecht, 1910
- Orthopelma* Taschenberg, 1865
 - Proedrus* Foerster, 1869
 - *mediator* (Thunberg, 1822)
 - Porizon rufinum* Gravenhorst, 1829
- Oxytorinae** Thomson, 1883
- Oxytorus* Foerster, 1869
 - Callidiotes* Foerster, 1869
 - *armatus* Thomson, 1883
 - *luridator* (Gravenhorst, 1820)
- Paxylommatainae** Foerster, 1862⁹
- Eurypterna* Foerster, 1862
 - Paxylomma cremieri* Romand, 1838
 - Ogkosoma* Haupt, 1913
 - *cremieri* (Romand, 1838)
 - *grandis* (Rudow, 1883)
 - Ghilaromma* Tobias, 1988
 - Ghilaromma orientalis* Tobias, 1988
 - *fuliginosi* Donisthorpe & Wilkinson, 1988
 - Hybrison* Fallén, 1813
 - Paxylomma* Latreille, 1817
 - *buccatus* (Brébisson, 1825)
 - Paxylomma buccata* Brébisson, 1825
 - *pilialatus* Tobias, 1988
- Phrudinae** Townes & Townes, 1949
- Phrudus** Foerster, 1869
 - Ktenostilpnus* Strobl, 1901
 - *badensis* Hilpert, 1987
 - *monilicornis* (Bridgman, 1886)
 - Pimplinae** Wesmael, 1945¹⁰
 - Ephialtini** Hellén, 1915
 - Acropimpla* Townes, 1960
 - Charitopimpla leucostoma* Cameron, 1907
 - Selenaspis* Roman, 1910
 - *didyma* (Gravenhorst, 1829)
 - *pictipes* (Gravenhorst, 1829)
 - Afrephialtes* Benoit, 1953
 - Ephialtes navus* Tosquinet, 1896
 - *cicatricosus* (Ratzeburg, 1848)
 - Atractogaster* Kriechbaumer, 1872
 - semisculptus* Kriechbaumer, 1872
 - Clistopyga* Gravenhorst, 1829
 - Ichneumon incitator* Fabricius, 1793
 - *incitator* (Fabricius, 1793)
 - Ichneumon incitator* Fabricius, 1793
 - *rufator* (Holmgren, 1856)
 - Delomerista* Foerster, 1869
 - Pimpla mandibularis* Gravenhorst, 1829
 - *laevis* (Gravenhorst, 1829)
 - *mandibularis* (Gravenhorst, 1829)
 - Pimpla mandibularis* Gravenhorst, 1829
 - *novita* (Cresson, 1870)
 - *pfankuchi* (Brauns, 1905)
 - *strandi* (Ulbricht, 1911)
 - Pimpla strandi* Ulbricht, 1911
 - *suborbitalis* (Gravenhorst, 1829)
 - Dolichomitus* Smith, 1877
 - Closterocerus* Hartig, 1847,
 - Diclosterocerus* Viereck, 1914,
 - Tuberculephialtes*, Ozols, 1962
 - *aciculatus* (Hellén, 1915)
 - *agnoscendus* (Roman, 1939)
 - *atratus* (Rudow, 1881)
 - *cephalotes* (Holmgren, 1860)
 - *curticornis* (Perkins, 1943)
 - *diversicostae* (Perkins, 1943)
 - *dux* (Tschek, 1869)
 - *imperator* (Kriechbaumer, 1854)
 - *kriechbaumeri* (Schulz, 1906)
 - *mesocentrus* (Gravenhorst, 1829)
 - *messor* (Gravenhorst, 1829)
 - *mordator* (Aubert, 1965)

- *populneus* (Ratzeburg, 1848)
- *pterelas* (Sey, 1929)
- *scutellaris* (Thomson, 1877)
- *sericeus* (Hartig, 1847)
- *terebrans* (Ratzeburg, 1844)
- *tuberculatus* (Geoffroy, 1785)
- Endromopoda* Hellén, 1939
 - Pimpla melanopyga* Gravenhorst, 1829
- *arundinator* (Fabricius, 1804)
- *nigricoxis* (Ulbricht, 1910)
- Ephialtes* Gravenhorst, 1829
 - Ichneumon manifestator* Linnaeus, 1758
 - *brevis* Morley, 1914
 - *duplicauda* (Heinrich, 1949)
 - *manifestator* (Linnaeus, 1758)
 - *spatulatus* (Townes, 1960)
- Exeristes* Foerster, 1869
 - Ichneumon robator* Fabricius, 1793
 - Eremochila* Foerster, 1869
- *arundinis* (Kriechbaumer, 1887)
 - Ephialtes arundinis* Kriechbaumer, 1887
- *longiseta* (Ratzeburg, 1844)
- *robator* (Fabricius, 1793)
 - Ichneumon robator* Fabricius, 1793
- *ruficollis* (Gravenhorst, 1829)
- Gregopimpla* Momoi, 1965
 - Pimpla kuvanae* Viereck, 1912
 - *bernuthii* (Hartig, 1838)
 - *inquisitor* (Scopoli, 1763)
 - *malacosomae* (Seyrig, 1927)
- Hybomischos* Baltazar, 1961
 - Perithous galbus* Baltazar, 1961
 - *septemcinctorius* (Thunberg, 1822)
- Iseropus* Foerster, 1869
 - Ichneumon graminellae* Schrank, 1802
 - Cnemopimpla* Cameron, 1903
 - *stercorator* (Fabricius, 1793)
- Liotryphon* Ashmead, 1900
 - Liogaster* Kriechbaumer, 1890
 - *ascaniae* (Rudow, 1883)
 - *caudatus* (Ratzeburg, 1848)
 - *crassiseta* (Thomson, 1877)
 - *cydiae* (Perkins, 1942)
 - *punctulatus* (Ratzeburg, 1848)
 - *strobilellae* (Linnaeus, 1758)
- Paraperithous* (Haupt, 1954)
 - Perithous atterimus* Haupt, 1954
 - *gnathaulax* (Thomson, 1877)
 - Ephialtes luteipes* Thomson, 1877
- Perithous* Holmgren, 1859
 - Ephialtes albicinctus* Gravenhorst, 1829
 - *albicinctus* (Gravenhorst, 1829)
 - Ephialtes albicinctus* Gravenhorst, 1829
 - *divinator* (Rossi, 1790)
 - *pimplarius* Haupt, 1938
 - *scurra* (Panzer, 1804)
 - *speculator* (Haupt, 1954)
- Scambus* Hartig, 1838
 - Pimpla sagax* Hartig, 1838
 - Epiurus* Foerster, 1869
- *alpestrator* Aubert, 1966
- *annulatus* (Kiss, 1924)
- *brevicornis* (Gravenhorst, 1829)
- *buolianae* (Hartig, 1838)
- *calobatus* (Gravenhorst, 1829)
- *elegans* (Woldstedt, 1877)
- *eucosmidarum* (Perkins, 1957)
- *foliae* (Cushman, 1938)
- *nigricans* (Thomson, 1877)
- *planatus* (Hartig, 1838)
- *pomorum* (Ratzeburg, 1848)
- *sagax* (Hartig, 1838)
- *signata* (Pfeffer, 1913)
- *strobilorum* (Ratzeburg, 1848)
- *vesicarius* (Ratzeburg, 1844)
- Townesia* Ozols, 1962
 - Ephialtes tenuiventris* Holmgren, 1860
 - *tenuiventris* (Holmgren, 1860)
 - Ephialtes tenuiventris* Holmgren, 1858
- Tromatobia* Foerster, 1869
 - Pimpla variabilis* Holmgren, 1856
 - Austropimpla* Bréthes, 1913
 - *oculatoria* (Fabricius, 1798)
 - Ichneumon oculatorius* Fabricius, 1798
 - *ornata* (Gravenhorst, 1829)
 - *ovivora* (Boheman, 1821)
 - *variabilis* (Holmgren, 1856)
 - Pimpla variabilis* Holmgren, 1856
- Zaglyptus* Foerster, 1869
 - *multicolor* (Gravenhorst, 1829)
 - *varipes* (Gravenhorst, 1829)
- Pimplini* Wesmael, 1945
- Apechitis* Foerster, 1869
 - Ichneumon rufatus* Gmelin, 1790
 - Ephialtes* Schrank, 1802
 - *capulifera* Kriechbaumer, 1879
 - *compuncitor* (Linnaeus, 1758)

- *quadridentata* (Thomson, 1877)
 - Apechthis resinator* Roman, 1909
- *rufata* (Gmelin, 1790)
- Itoplectis* Foerster, 1869
 - Ichneumon scanicus* Villers, 1789
 - Nesopimpla* Ashmead, 1906
 - *alternans* (Gravenhorst, 1829)
 - *aterrima* (Jussila, 1965)
 - *insignis* Perkins, 1958
 - *clavicornis* (Thomson, 1889)
 - *curticauda* (Kriechbaumer, 1887)
 - *enslini* (Ulbricht, 1911)
 - *maculator* (Fabricius, 1775)
 - *melanocephala* (Gravenhorst, 1829)
 - *tunetana* (Schmiedeknecht, 1914)
 - *viduata* (Gravenhorst, 1829)
- Pimpla* Fabricius, 1804
 - Ichneumon instigator* Fabricius, 1793
 - Coccygomimus* Saussure, 1892
 - Opodactyla* Seyrig, 1932
 - *aquilonia* (Cresson, 1870)
 - *arctica* (Zetterstedt, 1838)
 - *cheloniaea* Giraud, 1869
 - *contemplator* (Müller, 1776)
 - *flavicoxis* Thomson, 1877
 - *hypochondriaca* (Retzius, 1783)
 - *illecebrator* (Villers, 1789)
 - *manifestator* (Linnaeus, 1758)
 - *melanacrias* (Perkins, 1941)
 - *murinanae* (Fahringer, 1943)
 - *processioneae* Foerster, 1888
 - *sodalis* (Ruthe, 1859)
 - *spuria* (Gravenhorst, 1829)
 - *turionellae* (Linnaeus, 1758)
 - Strongylopsis* Brauns, 1896
 - *anomala* Brauns, 1896
 - Theronia* Holmgren, 1859
 - Ichneumon flavicans* Fabricius, 1793
 - Poecilopimpla* Cameron, 1903
 - *atalantae* (Poda, 1761)
 - Ichneumon melanops* Poda, 1781
 - *gestator* (Thunberg, 1822)
 - Ichneumon gestator* Thunberg, 1822
 - *laevigata* (Tschek, 1869)
 - Pimpla moravica* Kriechbaumer, 1892
 - Polysphinctini* Hellén, 1915
 - Acrodactyla* Haliday, 1839
 - Pimpla degener* Haliday, 1839
- Calpomeria* Holmgren, 1859
- *carinator* Aubert, 1965
- *degener* (Haliday, 1835)
- *madida* (Haliday, 1839)
- *quadrisculpta* (Gravenhorst, 1820)
 - Ichneumon quadrisculptus* Gravenhorst, 1820
- *rufithorax* (Györfi, 1944)
- Dreisbachia* Townes, 1962
 - Lauferia* Tosquinet, 1903
- *pictifrons* (Thomson, 1877)
- Oxyrrhexis* Foerster, 1869
 - Cryptus carbonator* Gravenhorst, 1807
- *carbonator* (Gravenhorst, 1807)
- Piogaster* Perkins, 1958
 - *albina* Perkins, 1958
 - *pilosator* (Aubert, 1958)
- Polysphincta* Gravenhorst, 1829
 - *boops* (Tschek, 1869)
 - *nielseni* (Roman, 1923)
 - *rufipes* (Gravenhorst, 1829)
 - *tuberosa* (Gravenhorst, 1829)
- Schizopyga* Gravenhorst, 1829
- Schizopyga* (*Schizopyga*) Gravenhorst, 1829
 - *circulator* (Panzer, 1800)
 - Ichneumon circulator* Panzer, 1800
 - *flavifrons* Holmgren, 1856
 - *frigida* (Cresson, 1870)
 - *podagriva* (Gravenhorst, 1829)
- Sinarachna* Townes, 1960
 - Polysphincta pallipes* Holmgren, 1860
 - *anomala* (Holmgren, 1860)
 - *nigricornis* (Holmgren, 1860)
 - *pallipes* (Holmgren, 1860)
- Zabrychypus* Cushman, 1920
 - *primus* Cushman, 1920
- Zatypota* Foerster, 1869
 - Ichneumon percontatorius* Müller, 1776
 - Polysphinctopsis* Habermehl, 1917
 - *albicoxa* (Walker, 1874)
 - *bohemani* (Holmgren, 1860)
 - *gracilis* (Holmgren, 1860)
 - *pallipes* (Schmiedeknecht, 1888)
 - *percontatoria* (Müller, 1776)
 - *picticollis* (Thomson, 1888)
- Poemeniinae* Narayanan & Lal, 1953
- Deuterroxorides* Viereck, 1914
 - Xorides albatarsus* Gravenhorst, 1829

- *elevator* (Panzer, 1799)
- Neoxorides* Clément, 1938
- Xorides nitenss* Gravenhorst, 1829
 - *collaris* (Gravenhorst, 1829)
 - Xorides collaris* Gravenhorst, 1829 - *nitens* (Gravenhorst, 1829)
 - *varipes* (Holmgren, 1860)
- Poemenia* Holmgren, 1859
- Ophiodes* Hartig, 1847
 - *brachyura* (Holmgren, 1860)
 - *collaris* (Haupt, 1917)
 - *hectica* (Gravenhorst, 1829)
 - *notata* (Holmgren, 1859)
- Pseudorhyssa* Merrill, 1915
- *alpestris* (Holmgren, 1860)
 - *maculicoxis* (Kriechbaumer, 1889)
- Rhyssinae** Morley, 1913
- Megarhyssa* Ashmead, 1900
- Thalessa* Holmgren, 1859
 - Megalorhyssa* Schulz, 1906
 - *emarginatoria* (Thunberg, 1822)
 - Ichneumon emarginatorius* Thunberg, 1822
 - Rhyssa leucographa* Gravenhorst, 1829
 - Thalessa emarginata* Holmgren, 1860 - *perlata* (Christ, 1791)
 - Ichneumon perlatus* Christ, 1791 - *rixator* (Schellenberg, 1802)
 - Ichneumon rixator* Schellenberg, 1802 - *superba* (Schrank, 1781)
 - Ichneumon superbus* Schrank, 1781
 - Ichneumon citratus* Geoffroy, 1785 - *vagatoria* (Fabricius, 1793)
 - Ichneumon gigas* Laxmann, 1770
 - Ichneumon histrio* Christ, 1791
 - Ichneumon clavatus* Fabricius 1798
- Rhyssa* Gravenhorst, 1829
- Ichneumon persuasorius* Linnaeus, 1758
 - Cryptocentrum* Kirby, 1837
 - *amoena* (Gravenhorst, 1829)
 - *persuasoria* (Linnaeus, 1758)
 - Ichneumon persuasorius* Linnaeus, 1758
- Rhyssella* Rohwer, 1920
- Rhyssa nitida* Cresson, 1864
- Rhyssella approximator* (Fabricius, 1793)
- Ichneumon approximator* Fabricius, 1793
 - Tryphon rugicollis* Zetterstedt, 1838
 - *obliterata* (Gravenhorst, 1829)
 - Calliclisis hungarica* Kiss, 1924
 - Megarhyssa areolata* Mocsáry, 1905
- Stilbopinae** Townes & Townes, 1949
- Stilbops* Foerster, 1869
- Pimpla vetula* Gravenhorst, 1829
 - Aphanoroptrum* Foerster, 1869
- *asper* (Schmiedeknecht, 1913)
- *limneriaeformis* (Schmiedeknecht, 1988)
 - *plementaschi* Hensch, 1930
 - *robustus* Kasparyan, 1984
 - *ruficornis* (Gravenhorst, 1829)
 - *vetulus* (Gravenhorst, 1829)
- Tersilochinae** Schmiedeknech, 1910
- Allophroides* (Horstmann, 1971)
- Porizon boops* Gravenhorst, 1829
 - *boops* (Gravenhorst, 1923)
 - *platyurus* (Strobl, 1904)
 - *rufifemus* Horstmann, 1971
- Aneuclis* Foerster, 1869
- Isurgus rufipes* Szépligeti, 1899
 - *anterior* Horstmann, 1971
 - *brevicauda* (Thomson, 1889)
 - *incidens* (Thomson, 1889)
 - *maritimus* (Thomson, 1889)
 - *melanarius* (Holmgren, 1860)
- Thersilochus melanarius* Holmgren, 1860
- Barycnemis* Foerster, 1869
- Porizon claviventris* Gravenhorst, 1829
 - Cratophion* Thomson, 1889
 - Zasterna lax* Viereck, 1912
 - *agilis* (Holmgren, 1860)
 - *alpina* (Strobl, 1901)
 - *angustipennis* (Holmgren, 1860)
 - *bellator* (Müller, 1776)
 - *claviventris* (Gravenhorst, 1829)
 - *dissimilis* Gravenhorst, 1829
 - *confusa* Horstmann, 1981
 - *exhaustor* (Fabricius, 1798)
 - *filicornis* (Thomson, 1889)
 - *gracilima* (Thomson, 1889)
 - *gravipes* (Gravenhorst, 1829)
 - *guttulator* (Thunberg, 1822)
 - *harpura* (Schrank, 1802)
 - *linearis* Ashmead, 1895
 - *probloides* Horstmann, 1981
 - *punctifrons* Horstmann, 1981
- Diaparsis* Foerster, 1869
- Porizon truncatus* Gravenhorst, 1829
 - Luchatema* Walkley, 1956

- Diaparsis (Diaparsis)* Foerster, 1869
Porizon truncatus Gravenhorst, 1829
– *carinifer* (Thomson, 1889)
Tersilochus carinifer Thomson, 1889
Tersilochus carininata Bridgman, 1889
Tersilochus vernalis Szépligeti, 1899
– *jucundus* (Holmgren, 1860)
– *multiplicator* Aubert, 1969
– *nutritor* (Fabricius, 1804)
– *punctipleuris* Horstmann, 1981
– *temporalis* Horstmann, 1979
– *truncata* (Gravenhorst, 1829)
- Diaparsis (Pseudaneuclis)* Horstmann, 1971
Pseudaneuclis rarus Horstmann, 1971
– *rara* (Horstmann, 1971)
- Epistathmus* Foerster, 1869
– *crassicornis* Horstmann, 1971
- Gelanes* Horstmann, 1981
Tersilochus fusculus Holmgren, 1860
– *clypeatus* Horstmann, 1981
– *fusculus* (Holmgren, 1860)
– *simillimus* Horstmann, 1981
– *tigmaticus* Horstmann, 1981
- Heterocola* Foerster, 1869
Tersilochus proboscidalis Thomson, 1889
- Heterocola (Heterocola)* Foerster, 1869
Tersilochus proboscidalis Thomson, 1889
– *proboscidalis* (Thomson, 1889)
- Heterocola (Heterocoloides)* Horstmann, 1971
Ischnobatis punctulatus Szépligeti, 1899
– *rufiventris* Horstmann, 1971
- Phradis* Foerster, 1869
Thersilochus brevis Brischke, 1880
– *brevis* (Brischke, 1880)
– *decrescens* (Thomson, 1889)
– *interstitialis* (Thomson, 1889)
– *minutus* (Bridgman, 1889)
– *morionellus* (Holmgren, 1860)
– *nigritulus* (Gravenhorst, 1829)
– *polonicus* Horstmann, 1971
– *rufiventris* Horstmann, 1971
- Probles* Foerster, 1869
Probles (Euporison) Horstmann, 1971
Tersilochus rufipes Holmgren, 1860
– *clavicornis* Horstmann, 1971
– *exilis* (Holmgren, 1860)
– *gilvipes* (Gravenhorst, 1829)
– *longicaudator* (Aubert, 1972)
- *marginatus* (Bridgman, 1886)
– *nigriventris* Horstmann, 1971
– *rufipes* (Holmgren, 1860)
– *tenuicornis* Horstmann, 1981
Euporizon tenuicornis Horstmann, 1981
– *truncorum* (Holmgren, 1860)
– *xanthopus* (Holmgren, 1860)
- Probles (Microdiaparsis)* Horstmann, 1971
– *microcephalus* (Gravenhorst, 1826)
– *neoversutus* (Horstmann, 1981)
– *versutus* (Holmgren, 1860)
- Probles (Probles)* Foerster, 1869
– *brevivalvis* Horstmann, 1971
– *erythrostomus* (Gravenhorst, 1829)
– *flavipes* (Szépligeti, 1899)
- Sathropteris* Foerster, 1869
Tersilochus pumilus Holmgren, 1860
– *pumilus* (Holmgren, 1860)
– *striola* (Thomson, 1873)
- Spinolochus* Horstmann, 1971
Thersilochus laevifrons Holmgren, 1860
– *laevifrons* (Holmgren, 1860)
- Tersilochus* Holmgren, 1859
- Tersilochus (Gonolochus)* Foerster, 1869
Gonolochus fenestratus Szépligeti, 1899
– *caudatus* (Holmgren, 1860)
– *stenocari* (Gregor, 1941)
- Tersilochus (Pectinolochus)* Aubert, 1960
– *asper* Horstmann, 1971
– *coeliadicola* (Silvestri, 1917)
– *ensifer* (Brischke, 1880)
– *lapponicus* (Hellén, 1958)
– *spiracularis* (Horstmann, 1971)
- Tersilochus (Tersilochus)* Holmgren, 1859
– *filicornis* (Thomson, 1889)
– *fulvipes* (Gravenhorst, 1829)
– *heterocerus* (Thomson, 1889)
– *jocator* (Holmgren, 1859)
– *liopleuris* (Thomson, 1889)
– *longicaudatus* Horstmann, 1971
– *longicornis* (Thomson, 1889)
– *microgaster* (Szépligeti, 1899)
– *nitidipleuris* Horstmann, 1971
– *obliquus* (Thomson, 1889)
– *obscurator* (Aubert, 1959)
–? *saltator* (Foerster, 1871)
– *subdepressus* (Thomson, 1889)

- *triangularis* (Gravenhorst, 1807)
- *tripartitus* (Brischke, 1880)
- *varius* Horstmann, 1981

- Tryphoninae Shuckard, 1840**

- Eclytini Townes & Townes, 1945**

- Eclytus* Holmgren, 1857
 - Eclytus ornatus* Holmgren, 1857
- Eclytus (Eclytus)* Kriechbaumer, 1896
 - Anoplectes multicolor* Kriechbaumer, 1896
 - Zapedias* Foerster, 1869
 - *egregius* Kasparyan, 1977
 - *exornatus* (Gravenhorst, 1829)
 - *haustoriatus* Kasparyan, 1977
 - *ornatus* (Holmgren, 1857)

- Exenterini Foerster, 1869**

- Acrotomus* Holmgren, 1857
 - Tryphon lucidulus* Gravenhorst, 1829
 - Delotomus* Foerster, 1869
 - *lucidulus* (Gravenhorst, 1829)
 - *succinctus* (Gravenhorst, 1829)
- Cteniscus* Haliday, 1832
 - Tryphon sexlituratus* Gravenhorst, 1829
 - *hofferi* (Gregor, 1937)
 - *inversus* (Roman, 1909)
 - *minutulus* Pfankuch, 1907
 - *pedatorius* (Panzer, 1809)
 - *scalaris* (Gravenhorst, 1829)
- Eridolius* Foerster, 1869
 - Exenterus pygmaeus* Holmgren, 1857
 - *alacer* (Gravenhorst, 1829)
 - *aurifluus* (Haliday, 1839)
 - Tryphon aurifluus* Haliday, 1839
 - *autumnalis* (Brischke, 1878)
 - *basalis* (Stephens, 1835)
 - *bimaculatus* (Holmgren, 1856)
 - *brevicornis* (Kasparyan, 1985)
 - *curtisii* (Haliday, 1839)
 - *deletus* (Thomson, 1883)
 - *dorsator* (Thunberg, 1822)
 - *elegans* (Stephens, 1835)
 - *flavicoxator* Kasparyan, 1990
 - *flavomaculatus* (Gravenhorst, 1829)
 - Tryphon flavomaculatus* Gravenhorst, 1829

- *gnatoxanthus* (Gravenhorst, 1829)
 - Tryphon gnatoxanthus* Gravenhorst, 1829
- *hofferi* (Gregor, 1937)
- *lineiger* (Thomson, 1883)
- *mitigosus* (Gravenhorst, 1829)
 - Tryphon mitigosus* Gravenhorst, 1829
- *pictus* (Gravenhorst, 1829)
 - Tryphon pictus* Gravenhorst, 1829
- *pullus* (Holmgren, 1857)
 - *pumilio* (Holmgren, 1860)
 - *punctipes* (Thomson, 1883)
 - *pygmaeus* (Holmgren, 1857)
 - *romani* (Kerrich, 1952)
 - *rufilabris* (Holmgren, 1857)
 - *similis* (Holmgren, 1857)
- Excavarus* Davis, 1897
 - Cteniscus annulipes* Cresson, 1868
- *apiarius* (Gravenhorst, 1829)
- Exenterus** Hartig, 1837
 - Ichneumon marginatorius* Fabricius, 1793
 - Actenonyx* Foerster, 1869
 - *abruptorius* (Thunberg, 1822)
 - Ichneumon abruptorius* Thunberg, 1822
 - *adspersus* (Hartig, 1838)
 - *amictorius* (Panzer, 1801)
 - Ichneumon amictorius* Panzer, 1801
 - *confusus* Kerrich, 1952
 - *ictericus* (Gravenhorst, 1829)
 - *oriolus* (Hartig, 1838)
 - *simplex* Thomson, 1883
 - *tricolor* Roman, 1913
 - *vellicatus* Cushman, 1940
- Exyston* Schiødte, 1839
 - Ichneumon cinctulus* Gravenhorst, 1820
 - Anecephysis* Foerster, 1869
 - *albicinctus* (Gravenhorst, 1820)
 - *calcaratus* Thomson, 1883
 - *genalis* Thomson, 1883
 - *pratorum* (Woldstedt, 1874)
 - Exenterus pratorum* Woldstedt, 1874
 - *sponsorius* (Fabricius, 1781)
 - Ichneumon sponsorius* Fabricius, 1781
 - *subnitidus* (Gravenhorst, 1829)
- Kristotomus* Mason, 1962
 - Tryphon ridibundus* Gravenhorst, 1829
 - *laetus* (Gravenhorst, 1829)
 - *laticeps* (Gravenhorst, 1829)
 - Tryphon laticeps* Gravenhorst, 1829

- *pumilio* (Holmgren, 1857)
 - *ridibundus* (Gravenhorst, 1829)
 - Tryphon ridibundus* Gravenhorst, 1829
 - *triangulatorius* (Gravenhorst, 1829)
 - Smicroplectrus* Thomson, 1883
 - Exenterus jucundus* Holmgren, 1857
 - Microplectron* Foerster, 1869
 - *bohemani* (Holmgren, 1857)
 - *bucculatus* Kasparyan, 1976
 - *erosus* Holmgren, 1857
 - *excisus* Kerrich, 1952
 - *jucundus* (Holmgren, 1857)
 - *nigricornis* Kasparyan, 1976
 - *perkinsorum* Kerrich, 1952
 - *quinquecinctus* (Gravenhorst, 1820)
- Idiodiogrammatini* Cushman, 1942
- Idiogramma* Foerster, 1869
 - Macrochasmus* Thomson, 1888
 - *alysiina* (Thomson, 1888)
 - *uryops* Foerster, 1888
- Oedemopsini* Woldstedt, 1877
- Hercus* Townes, 1969
 - Orthocentrus pleuralis* Provancher, 1875
 - *fontinalis* (Holmgren, 1857)
 - Neliopisthus* Thomson, 1883
 - Phytodietus elegans* Ruthe, 1855
 - *elegans* (Ruthe, 1855)
 - Oedemopsis* Tschek, 1869
 - Tryphon nasutus* Cresson, 1868
 - Hybophanes* Foerster, 1869
 - *scabricula* (Gravenhorst, 1829)
 - Thymaris* Foerster, 1869
 - *collaris* (Thomson, 1883)
 - *niger* (Taschenberg, 1865)
 - *tener* (Gravenhorst, 1829)
- Phytodietini* Cushman & Rohwer, 1920
- Netelia* Gray, 1860
 - Paniscus inquinatus* Gravenhorst, 1829
 - Netelia (Bessobates)* Townes, Townes et Gupta, 196
 - Parabatus deceptor* Morley, 1913
 - *cristata* (Thomson, 1888)
- *latungula* (Thomson, 1888)
 - *virgata* (Geoffroy, 1785)
 - Ichneumon virgatus* Fourcroy, 1785
 - Netelia (Netelia)* Gray, 1860
 - Paniscus inquinatus* Gravenhorst, 1829
 - *dilatata* (Thomson, 1888)
 - *fuscicornis* (Holmgren, 1860)
 - Paniscus fuscicornis* Holmgren, 1860
 - *ocellaris* (Thomson, 1888)
 - Paniscus ocellaris* Thomson, 1888
 - *paramelanura* Tolkanitz, 1981
 - *silantjevi* (Kokujev, 1899)
 - Paniscus silantjevi* Kokujev, 1899
 - *testacea* (Gravenhorst, 1829)
 - Paniscus testaceus*, Gravenhorst, 1829
 - *vinulae* (Scopoli, 1763)
 - Ichneumon vinulae* Scopoli, 1763
 - Netelia (Parabates)* Foerster, 1869
 - Parabaues nigricarpus* Thomson, 1888
 - *nigricarpus* (Thomson, 1888)
 - Netelia (Paropheltes)* Cameron, 1907
 - *caucasica* (Kokujev, 1899)
 - Paniscus caucasicus* Kokujev, 1899
 - *contiguator* Delrio, 1975
 - *lineolata* (Costa, 1883)
 - *tarsata* (Brischke, 1880)
 - *terebrator* (Ulbricht, 1922)
 - *thomsoni* (Brauns, 1889)
 - Phytodietus* Gravenhorst, 1829
 - Phytodietus (Neuchorus)* Uchida, 1931
 - Neuchorus longicauda* Uchida, 1931
 - *albitarsis* Kasparyan, 1993
 - *rufipes* Holmgren, 1860
 - Phytodietus (Phytodietus)* Gravenhorst, 1829
 - *alpinator* Aubert, 1969
 - *arcuatorius* (Thunberg, 1822)
 - Phytodietus crassitarsis* Thomson, 1887
 - *continuus* (Thomson, 1877)
 - *basalis* Kasparyan, 1993
 - *femoralis* Holmgren, 1860
 - *gelitorius* (Thunberg, 1822)
 - *geniculatus* Thomson, 1877
 - *griseanae* Kerrich, 1962
 - *montanus* Tolkanitz, 1979
 - *ornatus* (Desvignes, 1856)
 - *polyzonias* (Foerster, 1771)
 - Ichneumon segmentator* Gravenhorst, 1829
 - Phytodietus (Weisia)* Schmiedeknecht, 1907

- Weisia elegans* Schmiedeknecht, 1907
 – *bayeri* Gregor, 1935
Sphinctini Foerster, 1869
- Sphinctus* Gravenhorst, 1829
 – *Eradha* Cameron, 1899
 – *serotinus* Gravenhorst, 1829
- Tryphonini* Shuckard, 1840
- Boethus* Foerster, 1869
 – *Diplomorphus* Giraud, 1872
 – *thoracicus* (Giraud, 1872)
- Cosmoconus* Foerster, 1869
 – *Ichneumon elongator* Fabricius, 1775
 – *ceratophorus* (Thomson, 1888)
 – *Tryphon ceratophorus* Thomson, 1888
- *elongator* (Fabricius, 1775)
 – *hinzi* Kasparyan, 1971
 – *meridionator* Aubert, 1963
 – *nigriventris* Kasparyan, 1971
- Ctenochira* Foerster, 1855
 – *Ctenacme* Foerster, 1869
 – *Scopiorus* Roman, 1937
 – *angulata* (Thomson, 1883)
 – *angustata* (Roman, 1909)
 – *annulata* (Holmgren, 1857)
 – *Polyblastus annulatus* Holmgren, 1857
- *arcuata* (Holmgren, 1857)
 – *bisinuata* (Foerster, 1855)
 – *clara* Kasparyan, 1973
 – *flavicauda* (Roman, 1912)
 – *gelida* Kasparyan, 1973
 – *genalis* (Thomson, 1883)
 – *gilvipes* (Holmgren, 1857)
 – *haemosterna* (Haliday, 1839)
 – *helveticator* Aubert, 1965
 – *infesta* (Holmgren, 1855)
 – *marginata* (Holmgren, 1857)
 – *oreophila* (Schmiedeknecht, 1912)
 – *pastoralis* (Gravenhorst, 1829)
 – *Tryphon pastoralis* Gravenhorst, 1829
- *pectinata* (Bauer, 1958)
 – *pratensis* (Gravenhorst, 1829)
 – *propinqua* (Gravenhorst, 1829)
 – *romani* (Pfankuch, 1925)
 – *Scopimenus pygobarbus* Roman, 1937
 – *rubranator* (Aubert, 1965)
- *rufipes* (Gravenhorst, 1829)
 – *sanguinatoria* (Ratzeburg, 1852)
 – *spherocephalus* (Gravenhorst, 1829)
 – *validicornis* (Brischke, 1871)
 – *vetusta* (Holmgren, 1857)
 – *xanthopyga* (Holmgren, 1857)
- Dyspetes* Foerster, 1869
 – *arrogator* Heinrich, 1949
 – *praerogator* (Thomson, 1883)
- Erromenus* Holmgren, 1857
 – *Tryphon brunnicans* Gravenhorst, 1829
 – *Aniarophron* Foerster, 1869
 – *analis* (Brischke, 1871)
 – *bibulus* Kasparyan, 1973
 – *brunnicans* (Gravenhorst, 1829)
 – *calibrator* (Müller, 1776)
 – *junior* (Thunber, 1822)
 – *melanotus* (Gravenhorst, 1829)
 – *plebejus* (Woldstedt, 1878)
 – *punctatus* (Woldstedt, 1878)
 – *punctulatus* (Holmgren, 1857)
 – *tarsator* (Aubert, 1969)
 – *zonarius* (Gravenhorst, 1820)
- Grypocentrus* Ruthe, 1855
 – *Apimeles* Foerster, 1869
 – *albipes* (Ruthe, 1855)
 – *apicalis* Thoomsoon, 1883
 – *basalis* Ruthe, 1855
 – *cinctellus* (Ruthe, 1855)
 – *incisulus* (Ruthe, 1855)
- Monoblastus* Hartig, 1837
 – *Tryphon caudatus* Hartig, 1838
 – *Coeloconus* Foerster, 1869
- *brachyacanthus* (Gmelin, 1790)
 – *Ichneumon brachyacanthus* Gmelin, 1790
 – *caudatus* (Hartig, 1837)
 – *discedens* (Schmiedeknecht, 1912)
 – *fulvescens* (Fonscolombe, 1849)
 – *marginellus* (Gravenhorst, 1829)
 – *Lissonota marginella* Gravenhorst, 1829
- Otoblastus* Foerster, 1869
 – *Tryphon luteomarginatus* Gravenhorst, 1829
 – *luteomarginatus* (Gravenhorst, 1829)
 – *duplicatus* (Heinrich, 1953)
 – *Tryphon duplicatus* Heinrich, 1953
 – *fulviventris* (Holmgren, 1857)
 – *hinzi* (Heinrich, 1953)
- Polyblastus* Hartig, 1837

- Polyblastus (Labroctonus) Foerster, 1869*
- Tryphon articulatus* Cresson, 1868
 - *alternans* Schiodte, 1838
 - *pallicoxa* Thomson, 1888
 - *westringi* Holmgren, 1857
- Polyblastus (Polyblastus) Hartig, 1837*
- Tryphon varitarsus* Gravenhorst, 1829
 - *cancer* Hartig, 1837
 - ssp. *carbonator* (Kasparyan, 1970)
 - *clypearis* Brischke, 1891
 - *cothurnatus* (Gravenhorst, 1829)
 - *pinguis* (Gravenhorst, 1820)
 - *stenhammari* Holmgren, 1857
 - *subalpinus* Holmgren, 1855
 - *tener* Habermehl, 1909
 - *tuberculatus* Teunissen, 1953
 - *varitarsus* (Gravenhorst, 1829)
 - *wahlbergi* Holmgren, 1857
- Tryphon Fallén, 1813*
- Ichneumon rutilator* Linnaeus, 1761
- Tryphon (Stenocrotaphon) Kasparyan, 1969*
- Ichneumon obtusator* Thunberg, 1822
 - *nigrinus* (Brischke, 1871)
 - *obtusator* (Thunberg, 1822)
 - *subsulcatus* (Holmgren, 1857)
- Tryphon (Symboethus) Foerster, 1869*
- *bidentatus* (Stephens, 1835)
 - Tryphon incestus* Holmgren, 1855
 - *brevipetiolaris* Uchida, 1955
 - *exclamationis* (Gravenhorst, 1829)
 - *heliophilus* (Gravenhorst, 1829)
 - *brunniventris* (Gravenhorst, 1829)
- Tryphon (Tryphon) Fallén, 1813*
- Ichneumon rutilator* Linnaeus, 1761
 - *abditus* (Kasparyan, 1969)
 - *atriceps* (Stephens, 1835)
 - *auricularis* Thomson, 1883
 - *nigripes* Holmgren, 1857
 - *relator* (Thunberg, 1822)
 - Ichneumon relator* Thunberg, 1822
 - *rutilator* (Linnaeus, 1761)
 - *signator* (Gravenhorst, 1829)
 - *thomsoni* Roman, 1939
 - *trochanteratus* Holmgren, 1857
 - *zavreli* (Gregor, 1939)
- Xoridinae Shuckard, 1840*
- Ischnoceros* Gravenhorst, 1829
- Ichneumon rusticus* Geoffroy, 1785
- Mitroboris* Holmgren, 1859
- *caligatus* (Gravenhorst, 1829)
- Xylonomus seticornis* Kriechbaumer, 1879
- *rusticus* (Geoffroy, 1785)
- Odontocolon* Cushman, 1942
- Odontomerus* Gravenhorst, 1829
- *appendiculatum* (Gravenhorst, 1829)
- Odontomerus appendiculatus* Gravenhorst, 1829
- *dentipes* (Gmelin, 1790)
- Ichneumon dentipes* Gmelin, 1790
- *geniculatum* (Kriechbaumer, 1889)
- Odontomerus geniculatus* Kriechbaumer, 1889
- *punctulatum* (Thomson, 1877)
- *quercinum* (Thomson, 1877)
- Odontomerus quercinus* Thomson, 1877
- *rufiventris* (Holmgren, 1860)
- *spinipes* (Gravenhorst, 1829)
- *thomsoni* (Clément, 1938)
- Xorides* Latreille, 1809
- Ichneumon indicatorius* Latreille, 1806
- Xorides (Gonophonus) Foerster, 1869*
- *propinquus* (Tschech, 1869)
 - *scaber* (Gravenhorst, 1829)
 - *sepulchralis* (Holmgren, 1860)
 - *strandi* (Clément, 1938)
- Xorides (Moerophora) Foerster, 1869*
- Xylonomus rufipes* Gravenhorst, 1829
- *bischoffi* (Clément, 1938)
 - *ephialtoides* (Kriechbaumer, 1882)
 - *rufipes* Gravenhorst, 1829
- Xorides (Xorides) Latreille, 1809*
- Ichneumon indicatorius* Latreille, 1809
- *alpestris* (Habermehl, 1903)
 - *annulatus* (Gravenhorst, 1829)
 - *ater* (Gravenhorst, 1829)
 - *baueri* (Clément, 1938)
 - *brachylabis* (Kriechbaumer, 1889)
 - *depressus* (Holmgren, 1860)
 - *filiformis* Gravenhorst, 1829
 - *gravenhostii* Curtis, 1831
 - *hedwigi* Clément, 1938
 - *indicatorius* (Latreille, 1806)
 - Xylonomus ferrugatus* Gravenhorst, 1829
 - *irrigator* (Fabricius, 1793)
 - *minutus* Clément, 1938
 - *niger* (Pfeffer, 1913)
 - *praecatorius* (Fabricius, 1793)

REFERENCES

1. Aubert J.-F. 1969. Les Ichneumonides Ouest-Paléarctiques et leurs hôtes. 1. Pimplinae, Xoridinae, Acaenitinae. Alfortville, pp.302.
2. Aubert J.-F. 1969. Les Ichneumonides Ouest-Paléarctiques et leurs hôtes. 2. Banchinae et Suppl. aux Pimplinae. Échauffour, pp.318.
3. Błędowski R., Krańska M. 1924. Materiały do fauny gąsieniczników Polski [Material for the study of the fauna of Ichneumon flies in Poland].I.Pol. Pismo Ent. 3,1-19 [in Polish].
4. Błędowski R., Krańska M. 1924. Materiały do fauny gąsieniczników Polski. Podrodzina Ichneumoninae i Pimplinae [Material for the study of the fauna of Ichneumon flies in Poland. I. subfamily Ichneumoninae and Pimplinae].I. Pol. Pismo Ent. 3, 37-56 [in Polish].
5. Błędowski R., Krańska M. 1926. Material for the study of the fauna of Ichneumon flies in Poland. Pol. Pismo Ent. 5(1925),30-51 [in Polish].
6. Brischke C.G.A. 1871. Kleinere Beobachtungen über Insekten. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. (2)2(3/4),15-25.
7. Brischke C.G.A. 1871. Die Hymenopteren der Provinz Preussen Schif. Phys.-Okon. Ges., Königsberg, 11, 8-25.
8. Brischke C.G.A. 1878. Die Ichneumoniden der Provinzen West-und Ost-Preussen. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. 4(3),35-117.
9. Brischke C.G.A. 1880. Ichneumoniden der Provinzen West-und Ost-Preussen. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. 4(4),108-210.
10. Brischke C.G.A. 1881. Ichneumoniden der Provinzen West-und Ost-Preussen.II.Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. 5(1-2),331-353.
11. Brischke C.G.A. 1886. Hymenopteren des Bernsteins. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig.(2)6(3), 278-279.
12. Brischke C.G.A. 1888. ZweiterNachtrag zu den Beobachtungen über die Blatt-und Holzwespen. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig.(2) 7,6-12.
13. Brischke C.G.A. 1890. Einige für West Preussen oder überhauptne Ichneumoniden und Blattwespen. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. (2) 7(3),102-107.
14. Brischke C.G.A. 1892. Einige neue, oder für Westpreussen neue, Hymenopteren und Dipteren. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig.8(3),19-22.
15. Constantineanu R.M., Constantineanu M. J. 1968. Fam. Ichneumonidae. Trav. Mus. Hist. Natur. "Gr. Antipa", 9,149-183.
16. Constantineanu R.M., Pisica C. 1977.Hymenoptera, Ichneumonidae. Subfamilie Ephialtinae, Lycoriniae, Xoridinae si Acaenitinae. Fauna Republicii Socialiste Romania. 9(7),1-305.
17. Dalla Torre K.W., Dalla Torre C.G. 1901-1902. Catalogus Hymenopterorum hucusque descriptorum systematicus et synonymicus 3 p. 1141 (Ichneumonidae p.10-1057), Lipsiae.
18. Diller E. H. 1981. Bemerkungen zur Systematik der Phaeogenini mit einem vorläufigen Katalog der gattungen (Hymenoptera, Ichneumonidae). Entomofauna. 2,93-111.
19. Diller E. H., Horstmann K.1990. Typenrevision der von Maurice Pic beschriebenen Phaeogenini (Hymenoptera, Ichneumonidae). Entomofauna. 11,133-140.
20. Diller E. H., Horstmann K.1994. Typenrevision der von Victor Berthoumieu beschriebenen Phaeogenini (Insecta, Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae).Spixiana.17(3),247-260.
21. Diller E. H., Horstmann K.1997. Typenrevision der von Victor Berthoumieu beschriebenen Ichneumoninae (ohne Phaeogenini) (Insecta, Hymenoptera, Ichneumonidae).Spixiana. 20(1),39-71.
22. Dittrich R. 1909. Hymenopterologische Bemerkungen. III. Ein Beitrag zum Wirtzeichnis der Ichneumoniden. Jahresh. Schles. Insektenkunde.2,38-46.
23. Fitton M. G. 1982. A catalogue and reclassification of the Ichneumonidae (Hymenoptera) described by C.G. Thomson. Bull. Br. Mus. Nat. Hist. (Ent.) 45(1),1-119.
24. Gauld I.D. 1985. The phylogeny, classification and evolution of parasitic wasps of the subfamily Ophioninae (Ichneumonidae). Bull. of British Mus. Nat. Hist. (Entomol.) 51,1-185.
25. Gauld I.D., Mitchell P.A. 1977. Hymenoptera, Ichneumonidae (part), Orthopelmatinae et Anomalinae. Handb. Ident. British Insects, 7(2b), 29.
26. Głowiak J. 1953. Materiały do znajomości polskich gąsieniczników z podrodziny Ophioninae (Hymenoptera, Ichneumonidae)[Contribution to the knowledge of Polish Ichneumonidae from subfamilies Ophioninae (Hymenoptera, Ichneumonidae)]. Fragm. Faun. Mus. Polon. 6(22),569 – 584 [in Polish].

27. Główacki J. 1966. Uwagi o pasożytach wtórnych pomiędzy gąsienicznikami (Hymenoptera, Ichneumonidae) w faunie Polski [Notes on the secondary parasites among the ichneumon-flies (Hymenoptera, Ichneumonidae) in the fauna of Poland. Pol. Pismo Ent. 36, 377-382 [in Polish].
28. Główacki J. 1967. Aneks 1. Nowe gąsieniczniki (Hymenoptera, Ichneumonidae)- pasożyty zwójkowatych (Lepidoptera, Tortricidae) [Neue Ichneumoniden (Hymenoptera, Ichneumonidae)- Parasiten der Lärchenwicklern (Lepidoptera, Tortricidae)]. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Instytut Badawczy Leśnictwa. 315, 98-101 [in Polish].
29. Główacki J. 1978. Paszytnicze błonkówki. [In:] J. Lipa, J.J. Boczek (ed.) Biologiczne metody walki ze szkodnikami roślin. PWN, Warszawa, p.309 – 338 [in Polish].
30. Goulet H., Huber J. (red.) 1993. Hymenoptera of the world, An identification guide to families. Centr for Land Biological Resources Research, Ottawa, Ontario, 668.
31. Gravenhorst. I.L.C. 1807. Vergleichende Übersicht des Linneischen und einiger neurern zoologischen Systeme, nebst dem eingeschalteten Verzeichnisse der zoologischen Sammlung des Verfasser und den Beschreibungen neuer Thierarten, die in derselben vorhanden sind. Göttingen. 476 pp.
32. Gravenhorst. I.L.C. 1815. Monographia Ichneumonum pedestrium, praemissio prooemio de transitu et mutabilitate specierum et varietatum. Lipsiae. G.I. Göschen.110 pp.
33. Gravenhorst. I.L.C. 1818. Conspectus generum et familiarum Ichneumonidum. Nova Acta Physico Medico Acad. Caesareae Leopoldino-Crolinae Nat. Curio. 9,279-298.
34. Gravenhorst. I.L.C. 1820. Monographia Ichneumonum Pedemontanae Regionis. Memoriae della Reale Academia dell Scienze di Torino. 24,275-388.
35. Gravenhorst. I.L.C. 1829. Ichneumonologia Europaea. 1, p. 827. Vratislaviae.
36. Gravenhorst. I.L.C. 1829. Ichneumonologia Europaea. 2, p. 989. Vratislaviae.
37. Gravenhorst. I.L.C. 1829. Ichneumonologia Europaea. 3, p. 1097. Vratislaviae.
38. Hedwig K.1944. Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefundenen Hymenopteren.V. Ichneumonidae. Zeitschrift für Entomologie. Breslau.19(3),1-5.
39. Hedwig K.1962. Die Ichneumoniden des Naturschutzgebietes Glatzer (Spiegitzer) Schneeberg (Schlesien). Nachrichten der Naturwiss. Museums der Stadt Aschffenburg.69,25-54.
40. Heinrich G. H.1926. Beiträge zur Kenntnis der Ichneumonidenfauna Polens. Pol. Pismo Ent. 5,153-166.
41. Heinrich G. H.1927. Beiträge zur der Ichneumonidenfauna Polens.I. Nachtrag. (Ichneumoninae u. Pimplinae). Pol. Pismo Ent. 6,249-250.
42. Heinrich G. H.1929. Bemerkungen über die Ichneumoninae in Brischkes Sammlung zu Danzig. Konowia. 8,7-8.
43. Heinrich G. H.1936. Ichneumoninae Podola. Pol. Pismo Ent. 13(1934),21-42.
44. Heinrich G. H.1937. Ichneumonologische Notizen Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift für Polen .32,57-59.
45. Heinrich G. H.1937. Ichneumoninae Pokucia. Pol. Pismo Ent. 14 -15 (1935-1936), 122-143.
46. Heinrich G. H.1949a. Ichneumoniden des Berchesgadener Gebietes. Mitt. Münch. Ent. Ges. 35-39, 1-101.
47. Heinrich G. H.1949. Neue und interessante Schlupfwespen aus Bayern (Hymenoptera). Mitt. Münch. Ent. Ges. 35-39,101-127.
48. Heinrich G. H.1978. [Eastern Palearctic Hymenopterous insects of the subfamily Ichneumoninae.] (in Russian) Leningrad. 81pp.
49. Hellén W. 1961. Zur Ichneumonidenfauna Finnlands X (Hym.). Notulae Entomologicae.41,88-101.
50. Hellén W. 1961. Zur Ichneumonidenfauna Finnlands X (Hym.). Notulae Entomologicae.42,73-78.
51. Herting B. 1982. A catalogue of parasites and predators of terrestrial arthropods. Sect. B. Enemy/host or prey. Vol. II. Hymenoptera terebrantia. Slough, p. 40.
52. Hinz R. 1957. Zur Systematik und Ökologie der Ichneumoniden I (Hym.). Deutsche Entomologische Zeitschrift. 4,86-90.
53. Hinz R. 1961. Zur Systematik und Ökologie der Ichneumoniden II (Hym.). Deutsche Entomologische Zeitschrift. 8,250-257.
54. Hinz R. 1963. Zur Systematik und Ökologie der Ichneumoniden III (Hym.). Deutsche Entomologische Zeitschrift. 10,116-121.
55. Hinz R. 1972. Zur Systematik und Ökologie der Ichneumoniden IV (Hym.). Deutsche Entomologische Zeitschrift. 19(1-3),45-54.
56. Hinz R. 1976. Zur Systematik und Ökologie der Ichneumoniden V (Hym.). Deutsche Entomologische Zeitschrift. 23,99-105.

57. Horstmann K. 1969. Typenrevision der europäischen Arten der Gattung *Diadegma* Förster (syn. *Angitia* Holmgren). Beitr. Ent. 19, 413-472.
58. Horstmann K. 1969. Revision der Hellwigiinae Foerster (Hymenoptera, Ichneumonidae) Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft. 28(3),30-32.
59. Horstmann K. 1970. Bermerkungen zur Systematik einiger Gattungen der Campopleginae (Hymenoptera, Ichneumonidae). NachrBl. Bayer. Ent. 19,77-84.
60. Horstmann K. 1971. Revision der europäischen Tersilochinen (Hymenoptera, Ichneumonidae). Teil I. Veröff. Zool. St. München 15,47-138.
61. Horstmann K. 1972. Type revision of the species of Cryptinae and Campopleginae described by J.B. Bridgman (Hymenoptera, Ichneumonidae). Entomologist.105, 217-228.
62. Horstmann K. 1973. Revision der Gattung *Nepista* Förster (mit einer Übersicht über die Arten der Gattung *Leptoperillus* Schmiedeknecht) (Hymenoptera, Ichneumonidae). Pol. Pismo Ent. 43,729-741.
63. Horstmann K. 1974. Typenrevision von *Strobl* in der Gattung *Hemiteles* Gravenhorst p. l. beschrieben Arten und Formen (Hymenoptera, Ichneumonidae). Z. Arb. Öst. Ent. 26,103-112.
64. Horstmann K. 1975. Zur Systematyk einiger Arten der Gattung *Phygadeuon* Gravenhorst (Hymenoptera, Ichneumonidae). Z. Arb. Öst. Ent. 26(2-4)(1974), 103-112.
65. Horstmann K. 1976. Wenig bekannte oder neue europäische Hemitelinen-Gattungen (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). NachrBl. Bayer. Ent. 25, 22-31.
66. Horstmann K. 1977. Bermerkungen zur Systematik einiger Gattungen der Campopleginae. II. (Hymenoptera, Ichneumonidae). Mitt. Münch. Ent. Ges. 67,65-83.
67. Horstmann K. 1978. Revision der Gattungen der *Mastrina* Townes (Hymenoptera, Ichneumonidae, Hemitelinae). Z. Arb. Öst. Ent. 30, 65-70.
68. Horstmann K. 1981. Revision der europäischen Tersilochinen II (Hymenoptera, Ichneumonidae). Spixiana (suppl.) 4,1-76.
69. Horstmann K. 1986. Bemerkungen zur Systematik einiger Gattungen der Campopleginae III (Hymenoptera, Ichneumonidae). Mitt. Münch. Ent. Ges. 76,143-164.
70. Horstmann K. 1986. Revision der von Hartig beschrieben Ichneumoniden-Arten (Hymenoptera). Spixiana 8, 323-335.
71. Horstmann K. 1990. Die westpaläarktischen Arten einiger Gattungen der Cryptini (Hymenoptera, Ichneumonidae). Mitt. Münch. Ent. Ges. 79, 65-89.⁴
72. Horstmann K. 1992. Revision einiger Gattungen und Arten der Phygadeuontini. Mitt. Münch. Ent. Ges. 81, 229-254.
73. Kapuściński S.1948. Nowe pasożyty z podrodziny Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) dla fauny Polski i nowe ich stanowiska [Some species of insect parasites new to Polish fauna and new habitats of several species of those parasites belonging to the subfamilies Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae)]. Pol. Pismo Ent. 18, 69-78 [in Polish].
74. Karczewski J. 1978. Gąsieniczniki (Ichneumonidae, Hym.) wilgotnych lasów iglastych na szkodnikach borówki bagiennej (*Vaccinium uliginosum* L.)[Ichneumonids (Ichneumonidae, Hym.) of the moist coniferous forest with hosts on bog liberry (*Vaccinium uliginosum* L.)].Folia Forestalia Polonica. A(23),135-156 [in Polish].
75. Karczewski J. 1980. Przybliżenie do poznania pasożytów namiotnika czeremszaczka *Yponomeuta evonymellus* L. (Lep.Yponomeutidae) w Polsce [Some information on the entomophages of *Yponomeuta evonymellus* L.(Lep.Yponomeutidae) in Poland]. Sylvan.124,47-59 [in Polish].
76. Kasparyan D.R. 1981. Opredelitel po faune SSSR [A guide to the insects of the European part of the USSR. Hymenoptera, Ichneumonidae. Key to subfamilies]. 3(3), 1-41, 637-688 [in Russian].
77. Kasparyan D.R. 1981. Opredeliteli po faune SSSR [A guide to the insects of the European part of the USSR. Hymenoptera, Ichneumonidae. Subfamily Pimplinae (Ephialtiniae)].129,41-97 [in Russian].
78. Kaźmierczak T.1973. Zgławec trzpiennikowy *Rhyssa persuasoria* (L.)(Hymenoptera, Ichneumonidae), pasożyt szkodników technicznych drewna drzew iglastych oraz jego rola w biocenozie leśnej [*Rhyssa persuasoria* (L.)(Hymenoptera, Ichneumonidae), a parasite of insects that technically damage wood of the coniferous and its role in forest biocenosis]. Acta Agraria et Silv. S. Silv., 13, 89-120 [in Polish].
79. Kaźmierczak T. 1973. Zgławec powabny *Rhyssa amoena* Grav. (Hymenoptera, Ichneumonidae) jego morfologia, biologia i znaczenie gospodarcze. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 6,130 [in Polish].
80. Kaźmierczak T. 1974. *Pseudorhyssa maculicoxis* (Kriechbaumer) (Hymenoptera, Ichneumonidae) - rzadki kleptopasożyt w entomofaunie Polski [Pseudorhyssa maculicoxis (Kriechbaumer) (Hymenoptera, Ichneumonidae), a cleptoparasite rare for Poland].Przegląd Zool.18(2),213-216 [in Polish].

81. Kaźmierczak T. 1975. Role of parasites in decreasing population densities of some trunk pests of coniferous trees in Poland's South. VIII Internat. Plant Prot. Congress, Reports & Inform. S.V Biological & Genetic Control. Moscow, p.121-123.
82. Kaźmierczak T. 1975. *Netelia virgata* Geoffr. i *Netelia silantjevi* Kok. - nowe gatunki gąsienicznikowatych (Hymenoptera, Ichneumonidae) w entomofaunie Polski [Netelia virgata Geoffr. and Netelia silantjevi Kok., species of Ichneumonidae new for Poland (Hym.)]. Pol. Pismo Ent. 45(2),369-371 [in Polish].
83. Kaźmierczak T. 1977. *Megarhyssa emarginatoria* (Thunberg) (Hymenoptera, Ichneumonidae) w Polsce [Megarhyssa emarginatoria (Thunberg) (Hymenoptera, Ichneumonidae) in Poland]. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 122, Leśnictwo, 10,121-133 [in Polish].
84. Kaźmierczak T. 1978. Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae) rezerwatu Lipówka w Puszczy Niepołomickiej [Ichneumonidae (Hymenoptera) of the Lipówka Nature Reserve in the Niepołomice Forest.] Studia Naturae, S.A. 17, 207-221 [in Polish].
85. Kaźmierczak T. 1979. Morfologia europejskich gatunków plemienia zgłębców Rhyssini (Hymenoptera, Ichneumonidae)[Morphology of the European Rhyssini (Hymenoptera, Ichneumonidae)]. Acta Agraria et Silv. S. Silv. 18,104-119 [in Polish].
86. Kaźmierczak T. 1979. Zgłębce Rhyssini (Hymenoptera, Ichneumonidae) - pasożyty szkodników technicznych drewna drzew iglastych i liściastych oraz ich znaczenie w biocenozie lasu [Rhyssini (Hymenoptera, Ichneumonidae) – parasites of wood damage insects and their importance in forest biocenosis]. Acta Agraria et Silv. S. Silv. 18,121-137 [in Polish].
87. Kaźmierczak T. 1979. Przegląd europejskich gatunków plemienia zgłębców Rhyssini (Hymenoptera, Ichneumonidae)[A review of European species of the tribe Rhyssini (Hymenoptera, Ichneumonidae)]. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 156, Leśnictwo, 12,35-50 [in Polish].
88. Kaźmierczak T. 1980. Możliwości wykorzystania gąsienicznikowatych (Hymenoptera, Ichneumonidae) do zwalczania szkodników owadzich. XXXVII Zjazd PTE Kraków 22-24.09..p.1-7 [in Polish].
89. Kaźmierczak T. 1980. Rewizja stanowiska systematycznego rodzaju *Pseudorhyssa* Merrill (Hymenoptera, Ichneumonidae)[Revision of genus *Pseudorhyssa* Merrill (Hymenoptera, Ichneumonidae)].Acta Agraria et Silv. S. Silv. 19, 41-55 [in Polish].
90. Kaźmierczak T.1981a. Polskie zgłębce - Rhyssini (Hymenoptera, Ichneumonidae)[Polish Rhyssini (Hymenoptera, Ichneumonidae)].Monografie Fauny Polski. 12,1-111. PWN, Warszawa - Kraków [in Polish].
91. Kaźmierczak T.1981.Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae)[Ichneumonidae wasps (Hymenoptera)]. Wszechświat. 5,119-123 [in Polish].
92. Kaźmierczak T.1982. Znaczenie entomofagów w regulacji czisłennosti niektórych nasekomych-wreditelej w lesach jużnoj Polszy [Significance of entomophagous in regulating the insect pests number in forests of Southern Poland]. Internat. Scientific Conference. Zvolen 41-48 [in Russian].
93. Kaźmierczak T. 1984. The European Rhyssini (Hymenoptera, Ichneumonidae).Verh. Internat. Symp. Entomofaun. Mitteleur.10,268-269.
94. Kaźmierczak T. 1987. Związki troficzne pomiędzy parazytoidami z rodziny gąsienicznikowatych (Hymenoptera, Ichneumonidae) i owadami niszczącymi drzewa w lasach Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy [Trophic relations between parasitoids of the family Ichneumonidae (Hymenoptera) and insects infesting trees of the forest experimental station in Krynica]. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 212, Leśnictwo, 17,31-39 [in Polish].
95. Kaźmierczak T. 1988. Ichneumonidae (Hymenoptera) and their role in the main forest communities in the surroundings of Krynica (Beskid, Sądecki, Karpaty Mts.). Proceedings XVIII International Congress of Entomology, Vancouver, B.C.Canada 3.07-9.07., p. 438.
96. Kaźmierczak T. 1988.Zmiany w składzie gatunkowym i liczebności gąsienicznikowatych (Hymenoptera, Ichneumonidae) w zasięgu oddziaływanie Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego [Changes in the species composition and numbers of Ichneumons (Hymenoptera, Ichneumonidae) within the range of influence of the Tarnobrzeg Sulphur Basin]. Studia Naturae – Seria A. 31,101-116 [in Polish].
97. Kaźmierczak T. 1988. Najezdniki semejstwa Ichneumonidae i ich rol w osnownych lesnych soobszczestwach Peninskogo Nacionalnogo Parka [Ichneumonidae (Hymenoptera) and their role in the main forest communities in the Pieniny National Park]. XII Internat. Symp.Entomofaun. Mitteleur., Kijew 25-30.9, 69 [in Russian].
98. Kaźmierczak T. 1989. Dendrofilna fauna gąsienicznikowatych (Hymenoptera, Ichneumonidae) i jej rola w głównych zbiorowiskach leśnych Ojcowskiego Parku Narodowego [Ichneumonidae (Hymenoptera) and

- their role in main plant communities of the Ojców National Park]. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 232, Leśnictwo, 23, 91-104 [in Polish].
99. Kaźmierzak T. 1990. Ichneumonidae (Hymenoptera) of the surroundings of Gastein in the Alps Part 1. *Acta Zoologica Cracoviensia*. 33(15-280), 501-512.
 100. Kaźmierzak T. 1990. Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae) Ojcowskiego Parku Narodowego [Ichneumonidae (Hymenoptera) of the Ojców National Park. Prądnik. Prace Muz. Szafera]. 1, 105-111 [in Polish].
 101. Kaźmierzak T. 1991. Ichneumonidae (Hymenoptera) of the surroundings of Gastein in the Alps Part II. *Acta Zoologica Cracoviensia*. 34(1), 65-98.
 102. Kaźmierzak T. 1991. Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae) w głównych zbiorowiskach roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego [Ichneumonidae (Hymenoptera) in the main plant associations of the Ojców National Park]. *Ochr. Przyr.* 48, 239-266 [in Polish].
 103. Kaźmierzak T. 1992. Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae) wybranych zbiorowisk łąkowych Pienińskiego Parku Narodowego [Ichneumonidae (Hymenoptera) of the selected meadow communities of the Pieniny National Park]. *Pieniny - Przyroda i Człowiek*, 2, 71-84 [in Polish].
 104. Kaźmierzak T. 1992. Changes in the species composition and number of some insects within the range of the effect of industrial immersions in Southern Poland in the years 1965-1990. IBL, konf. IUFRO, 16-21.9.1991.
 105. Kaźmierzak T. 1993. Ichneumonidae (Hymenoptera) of the selected region of Southern Poland. *Acta Zool. Cracov.*, 36 (1), 77-120.
 106. Kaźmierzak T. 1995. Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae) rezerwatu Madohora w Beskidzie Małym. 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Poznań 8-10.09.p.6 [In Polish].
 107. Kaźmierzak T. 1995. Entomofagi ograniczające występowanie owadów szkodników leśnych. III Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Ojców 23-24.09. Biuletyn Sekcji Hymenopterologicznej PTE, 4, 1-2 [In Polish].
 108. Kaźmierzak T. 1996. Nowe związki troficzne pomiędzy parazytidami z rodziny gąsienicznikowatych (Hymenoptera, Ichneumonidae) i ich żywicielami. IV Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Ojców 23-24.09. Biuletyn Sekcji Hymenopterologicznej PTE Nr 5, 3-4 [in Polish].
 109. Kaźmierzak T. 1997. Szkodniki świerka pospolitego *Picea abies* (L.) Karst. i ich pasożytnicze błonkówki wykazane w latach 1996-1997 w Nadleśnictwie Wiśla. V Sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Ojców 22-23.09. Biuletyn Sekcji Hymenopterologicznej PTE 6, 1-3 [In Polish].
 110. Kaźmierzak T. 1998. Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae) Ojcowskiego Parku Narodowego. Sympozjum. Badania faunistyczne w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1988-1997. Ojców 7-9 V. Materiały Sesji, p. 13.
 111. Kaźmierzak T. 1999. Biologiczne metody zwalczania szkodliwych owadów leśnych. Sesja Posterowa 50 Lat Studiów Leśnych w Krakowie, Poster. Kraków 29.09-4.10. [In Polish].
 112. Kaźmierzak T. 1999. Entomofagi szkodników wtórnych świerka w rezerwacie Madohora w Beskidzie Małym. VI Sympozjum Sympozjum Sekcji Hymenopt. PTE, Ojców, 19-20.04. 9, 16-17 [in Polish].
 113. Kaźmierzak T. 2000. Pasożytnicze błonkówki ograniczające liczebność ścigi matowej *Tetropium fuscum* (F.) (Coleoptera, Cerambycidae) szkodnika wtórnego świerka pospolitego *Picea abies* (L.) Karst. w rezerwacie Madohora w Beskidzie Małym. VII. Sympozjum Sekcji Hymenopt. PTE, Ojców, 8-10.05.10, 11 [in Polish].
 114. Kaźmierzak T. 2001. Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae) Ojcowskiego Parku Narodowego w latach 1998-2000. XX lat Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Badania Naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ojców, p. 269-270 [in Polish].
 115. Kaźmierzak T. 2002. Poznanie entomofagów zagwoździka złocistozielonego *Callidium aeneum* (De Geer) i zagwoździka fiołkowego *Callidium violaceum* (L.) (Coleoptera, Cerambycidae) Pienińskiego Parku Narodowego. IX Sympozjum Sekcji Hymenopt. PTE, Ojców, 6-7.05.p.11 [in Polish].
 116. Kaźmierzak T. 2002. Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae) Pienińskiego Parku Narodowego w latach 1997-2001. V Sesja Naukowa, Badania Naukowe w Pieninach 20.06.p. 12 [in Polish].
 117. Kaźmierzak T., Dąbrowski J. 2003. Natural enemies of burnets (Lepidoptera, Zygaenidae). II. Contribution to knowledge of Hymenoptera (Ichneumonidae, Braconidae, Chalcididae, Pteromalidae, Encyrtidae, Torymidae, Eulophidae) parasitizing the burnets. *Atalanta* 34(93/4), 443-451.

118. Kaźmierzak T., Ostapski W. 1982. Związki troficzne pomiędzy owadami uszkadzającymi korę i drewno sosny pospolitej (*Pinus sylvestris L.*) i niektórymi ich entomofagami [Trophic relations between the insects damaging the bark and wood of pina (*Pinus sylvestris L.*) and some their entomofagous insets]. *Zesz. Nauk. AR w Krakowie* 172, Leśnictwo 14,75-89 [in Polish].
119. Kaźmierzakowa R., Kaźmierzak T., Kosior A. 1997. Kwiecistość łąk Pienińskiego Parku Narodowego i jej związek z fauną trzmielowatych (Bombini) i gąsienicznikowatych (Ichneumonidae) [Flower abundance of the Pieniny national Park meadows and the related fauna of Bombini and Ichneumonidae]. *Ochr. Przyr.* 54, 27-58 [in Polish].
120. Kerrich G.J. 1960. The state of our knowledge of the systematics of the Hymenoptera Parasitica, with particular reference to the British fauna. *Trans. Soc. Brit. Ent.*, 14,1-18.
121. Kościelska M. 1956. Gąsieniczniki (Ichneumonidae, Hymenoptera) nowe dla fauny Polski i kilka uwag o gatunkach bardzo rzadkich [Les Ichneumonides (Hymenoptera) nouveaux pour la faune Polonaise et quelques remarques sur les espèces plus rares.] *Pol. Pismo Ent.* 25(1955),115-123 [in Polish].
122. Kościelska M. 1959. Gąsieniczniki (Hym. Ichneumonidae) pół uprawnych Polski Zachodniej [Die echten Schlupfwespen der Ackerfeldern in Westpolen (Hym. Ichneumonidae)]. *Pol. Pismo Ent.* 29,179-194 [in Polish].
123. Kościelska M. 1972. Gąsieniczniki Ichneumonidae (Hymenoptera) rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy. [Ichneumons (Hymenoptera) in the reserve Muszkowicki Las Bukowy]. *Ochr. Przyr.* 37,105-125 [in Polish].
124. Kościelska M. 1973. Badania nad pasożytami namiotnika jabłoniowego *Hyponomeuta malinellus* Zell. [Investigations on the parasites of *Hyponomeuta malinellus* Zell.]. *Acta Univ. Wratislaviensis.* 185,63-68 [in Polish].
125. Kucharczyk I. & Wiąkowski S. 1984. Przyczynek do poznania roli wrogów naturalnych *Bupalus piniarius*, *Panolis flammea*, *Hyloicus pinastri* and *Diprion* spp. w Środkowej Polsce [Contribution to the knowledge of the role of natural enemies of *Bupalus piniarius*, *Panolis flammea*, *Hyloicus pinastri* and *Diprion* spp. in central Poland]. *Sylvan.* 128,33-40 [in Polish].
126. Medwedew G.S. (red.) 1981. Opredelitel nasekomych ewropejskoj czasti SSSR, pereponczatokrylyje [A guide to the insects of the European part of the USSR. Hymenoptera]. Vol.3, part.3. Akademia Nauk SSSR, Zooł. Inst. 1- 688 [in Russian].
127. Meyer N.F. 1933-1936. Parasiticzeskije pereponczatokrylyje sem. Ichneumonidae SSSR i sopredelnych stran. Opredeliteli po faune SSSR izdawajemyje Zooł. Inst. AN SSSR [Parasitic Hymenoptera in the family Ichneumonidae of the USSR and adjacent countries. Keys to the fauna of the USSR]. Vol.1-6 [in Russian].
128. Miczulski B. 1988. Spadek liczebności pasożytniczych błonków w dynamice populacji chrząszcza *Oulema* spp. (Coleoptera, Chrysomelidae) [Incidence of parasitic Hymenoptera in the population dynamics of the cereal laef beetles, *Oulema* spp. (Coleoptera, Chrysomelidae)]. *Ekologia Polska.* 35 (3-4)(1987),741-754.
129. Noskiewicz J. 1948. Dodatki do fauny gąsieniczników (Ichneumonidae) Śląska. I. Ichneumoninae stenopneusticae [Contribution to the knowledge of the fauna Ichneumonidae of Silesia]. *Pol. Pismo Ent.* 18, 213-336 [in Polish].
130. Noskiewicz J. 1958. Przegląd śląskich gatunków plemienia Rhyssini [Revision of Silesian species of the tribe Rhyssini]. *Pol. Pismo Ent.* 28, 91-108.
131. Noskiewicz J., Sembrat K., Szarski K. 1961. Osobliwości faunistyczne Karkonoskiego Parku Narodowego [Faunistic curiosities of Karkonoski National Park]. *Ochr. Przyr.*, 27, 27-41 [in Polish].
132. Oehlke J. 1966. Die westpaläarktische Arte der Tribus Poemeniini (Hymenoptera, Ichneumonidae). Beiträge zur Entomologie. 15 (1965), 881-892.
133. Oehlke J. 1967. Westpaläarktische Ichneumonidae 1, Ephialtinae. Hymenopterorum Catalogus, (nova editio. `s-Gravenhage. 2,1- 49.
134. Oehlke J. 1971. Zur Situation der Ichneumonidenforschung in Europe. International Congress Entomology.1,183.
135. Piekarzka H. 1988. Gąsienicznikowe z podrodziny Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) pasożytujące na poczwarkach *Galleria melonella* L. (Lepidoptera, Pyralidae) introdukowanych do sadów owocowych [Ichneumons of the subfamily Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) parazitizing pupae of *Galleria melonella* L. (Lepidoptera, Pyralidae), introduced in an orchard.] *Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu.* 180,143-150.

136. Piekarska H. 1989. Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae) parazytoidy zwójek sadów jabłoni w okolicy Poznania [Ichneumonids (Hymenoptera) parasites of leaf-rollers in appleorchards in Poznań vicinity]. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. 202, 153-162.
137. Piekarska-Boniecka H. 1992. Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) w zbiorach Muzeum Środowiskowym Centrum Badań Rolnictwa i Leśnictwa PAN w Poznaniu [Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) in the collection of the Museum of the Environment] (Research Center of Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences) in Poznań. Ann.Up. Sil. Mus. Bytom. Entomol. 3, 71-79 [in Polish].
138. Piekarska-Boniecka H. 1994. Przyczynek do poznania zwójkowatych (Lepidoptera, Tortricidae) i ich parazytidów (Hymenoptera, Ichneumonidae) występujących na czerwonej porzeczce w okolicy Poznania [Contribution to the knowledge of the leaf-rollers (Lepidoptera, Tortricidae) and their parasitoids (Hymenoptera, Ichneumonidae) occurring on the red currant in the environs of Poznań]. Wiadomości Entomologiczne. 13(3), 185-190 [in Polish].
139. Piekarska H. & Kuśmierzak B. 1990. Przyczynek do poznania fauny gąsieniczników (Hymenoptera, Ichneumonidae) pasożytujących na zwójkach "liściowych" jabłoni w sadach okolic Poznania [Contribution to the knowledge of the fauna of Ichneumonids (Hymenoptera, Ichneumonidae) parasitizing on apples leaf-rollers in orchards in Poznań vicinity]. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. 217 (18), 53-64 [in Polish].
140. Piekarska-Boniecka H. & Sawoniewicz J. 1994. Przyczynek do poznania Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) w dolinie Biebrzy [Contribution to the knowledge of Pimplinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) occurring in the Biebrza Valley lower bassin]. Wiadomości Entomologiczne. 13(1), 41-53 [in Polish].
141. Rasnitsyn A.P. 1981. Gravenhorst's and Bertoumieu's types of Ichneumoninae Stenopneusticae preserved in Wrocław and Cracow, Poland (Hymenoptera, Ichneumonidae). Pol. Pismo Ent. 51(1), 101-145.
142. Razowski J. 1997 (red.). Wykaz zwierząt Polski. [Checklist of animal of Poland]. Wydawnictwa Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN Kraków Vol.5., part. XXXII/24 Hymenoptera – Błonkówki [in Polish].
143. Sachtleben H. 1962. Bibliographie der paläarktischen Ichneumoniden. Beitr. Ent. 12, 1-242.
144. Sawoniewicz J. 1973. Benjaminia polonica sp. n., a new species of Ichneumonidae (Hymenoptera) from Poland. Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. II, 21, 667-669.
145. Sawoniewicz J. 1973. Gąsienicznikowate (Ichneumonidae, Hymenoptera) odwiedzające kwiaty goryszu - Peucedanum oreoselinum L. (Umbelliferae) [Ichneumonidae (Hymenoptera) visiting the flowers of Peucedanum oreoselinum L. (Umbelliferae)]. Folia Forestalia Polonica. 21, 43-78 [in Polish].
146. Sawoniewicz J. 1976. Przyczynek do poznania gąsieniczników (Hymenoptera, Ichneumonidae) Pienin [Beitrag zur Kenntnis der echten Schlupfwespen Hymenoptera, Ichneumonidae) der Pieninen]. Fragmenta Faunistica. 21, 201-219 [in Polish].
147. Sawoniewicz J. 1978. Zur Systematik und Faunistik der (Ichneumonidae, Hymenoptera). Ann. Zool. 34, 121-137.
148. Sawoniewicz J. 1979. The effect of shrub layer on the occurrence of the Ichneumonidae (Hymenoptera) in pine stands on different sites. Memorabilia Zool. 30, 89-130.
149. Sawoniewicz J. 1980. Revision of European species of the genus Bathythrix Foerster (Hymenoptera, Ichneumonidae). Ann. Zool. 35, 319-365.
150. Sawoniewicz J. 1981. Gąsieniczniki (Ichneumonidae, Hymenoptera) [Ichneumonidae (Hymenoptera)] [In:] Zoocenologiczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego "Białołęka Dworska" w Warszawie. Cz. I. Skład gatunkowy i struktura fauny terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego. Fragm. Faun. 26(17), 285-308 [in Polish].
151. Sawoniewicz J. 1982. Gąsienicznikowate (Hymenoptera, Ichneumonidae) Warszawy i Mazowsza [Ichneumonidae (Hymenoptera) of Warsaw and Mazovia]. Memorabilia Zoologica. 36, 5-39 [in Polish].
152. Sawoniewicz J. 1984. Revision of some type-specimens of European Ichneumonidae (Hymenoptera). Annales Zoologici. 37, 313-330.
153. Sawoniewicz J. 1985. Revision of European species of the subtribe Endaseina (Hymenoptera, Ichneumonidae), I. Annales Zoologici. 39, 131-145.
154. Sawoniewicz J. 1986. Revision of some type-specimens of European Ichneumonidae (Hymenoptera), 2. Ann. Zool. 40, 371-380.
155. Sawoniewicz J. 1986. Structure of Ichneumonidae (Hymenoptera) communities in urban green areas of Warsaw. Memorabilia Zool. 41, 103-139.

156. Sawoniewicz J. 1988. Revision of some type-specimens of European Ichneumonidae (Hymenoptera), 3. Ann. Zool. 41,481-490.
157. Sawoniewicz J. 1988. Revision of some type-specimens of European Ichneumonidae (Hymenoptera), 4. Ann. Zool. 42(9), 215-224.
158. Sawoniewicz J. 1989. Ichneumonidae (Hymenoptera) of moist meadows on the Mazovian Lowland. Memorabilia Zool. 43,249-263.
159. Sawoniewicz J. 1990. Revision of European species of the subtribe Endaseina (Hymenoptera, Ichneumonidae), II. Genus *Amphibulus* Kriechbaumer, 1893. Ann. Zool. 43(11),287-291.
160. Sawoniewicz J. 1990. Revision of some type-specimens of European Ichneumonidae (Hymenoptera), 5. Ann. Zool. 43,293-299.
161. Sawoniewicz J. 1993. Untersuchungen zur Systematik der europäischen Aletesini-Arten (Hymenoptera, Ichneumonidae). Entomofauna. 14(2),13-32.
162. Sawoniewicz J. 1995. Diversification of communities of Ichneumoninae (Hymenoptera, Ichneumonidae) of canopies of pines during secondary succession of the pine forest of Puszcza Białowieska. Fragm. Faun. 38, 435-446.
163. Sawoniewicz J. 1996. Porównanie potencjału regulacyjnego zgrupowań gąsienicznikowatych (Hymenoptera, Ichneumonidae) w koronach jodły (*Abies alba* Mill.)[Comparison of the regulating potential associations of Ichneumonidae (Hymenoptera) in crowns of *Abies alba* Mill. [In:] Porównanie potencjału regulacyjnego szkodników jodły w różnych rejonach Polski. Wydawn. Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa, p. 48-83.[in Polish].
164. Sawoniewicz J. 1996. Boleslawia burakowskii gen. nov. et sp. nov. from Poland (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae). Genus, 7, 493-496.
165. Sawoniewicz J. & Buszko J. 1994. Gąsienicznikowe wyhodowane z min motyli w Polsce [Ichneumonidae (Hymenoptera) reared from mining Lepidoptera in Poland]. Wiadomości Entomologiczne. 13(1),55-61 [in Polish].
166. Sawoniewicz J. & Luman J.C. 1992. Revision of European species of the subtribe Endaseina, III Genus *Endasys* Foerster, 1868 (Hymenoptera, Ichneumonidae). Entomofauna. 13,1-96.
167. Sawoniewicz J. & Piekarska H. 1989. Gąsienicznikowe (Hymenoptera, Ichneumonidae) w zbiorach Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu [Ichneumonidae (Hymenoptera) in the collections of the Institute of Plant Protection in Poznań]. Roczniki Nauk Rolniczych, S.E Ochrona Roślin.17(1987),189-224 [in Polish].
168. Schimitschek E. 1962. Parasitenzuchten 1954 bis 1960. Z. Angew. Zool., 49,211-226.
169. Schimitschek E. 1964. Liste der 1934-1936 und 1940-1953 gezogenen Parasiten und ihrer Wirte. Z.Ang. Ent. 53, 320-341.
170. Schmiedeknecht O. 1907. Hymenopteren Mitteleuropas. Gustav Fischer.Jena. 804 pp. (Ichneumonidae on pp.537-753).
171. Schmiedeknecht O. 1909. Opuscula Ichneumonologica. 4. *Ophioninae*, Fasc. 23, Blankenburg, p. 1761-1840.
172. Schwarz M. 2002. Revision der westpaläarktischen Arten der Gattungen *Gelis* Thunberg mit apteren Weibchen und *Thaumatogelis* Schwarz (Hymenoptera, Ichneumonidae). Linzer biol. Beitr. 34/2, 3, 1293–1392.
173. Schwarz M. 2003. Die Gattung *Diaglyptelodes* Aubert (Hymenoptera, Ichneumonidae). Linzer biol. Beitr. 35/2, 1091-1096.
174. Schwarz M, Rieman H. 2003. Verbreitung von *Thaumatogelis gallicus* (Seyrig) (Hymenoptera, Ichneumonidae) in Deutschland sowie ein Überblick über die *Thaumatogelis*-Fauna von Niedersachsen Abh. Naturwiss. Verein Bremen 45/2, 449-452.
175. Šedivý J. 1956. Prispevek k poznání lumen z tribu Hellwigiini, Anomalonini a Theronini v CSR [Contribution to the knowledge of the Ichneumonidae from tribe Hellwigiini, Anomalonini a Theronini in CSR]. Acta Faun. Ent. 1,127-139 [in Czech].
176. Šedivý J. 1989. Check list of Czechoslovak insects III (Hymenoptera). Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Prague. [Ichneumonidae pp. 49-134.]
177. Stein J.P.E.F. 1870. Ueber Eurypterna (Foerst.) *cremieri* Brébisson. Berliner Entomologische Zeitschrift.14,426.
178. Thompson W. R. 1957. A catalogue of the parasites and predators of insects pests. Section 2, Host parasite catalogue. Host of the Hymenoptera (Ichneumonidae). Ottawa, Canada, 4,1-561.

179. Tobias W.I. Familja Paxylommatidae (Hymenoptera) w faune SSSR [The family Paxylommatidae (Hymenoptera) in the fauna of the USSR]. Trudy Wsesojuznogo Entomologiczeskogo Obszczestwa.70,131-143 [in Russian].
180. Tolkanic V.I. 1987. Fauna Ukrainy. Parasiticzeskije pereponczatokrylyje [Fauna Ukraine.Parasitic Hymenoptera].2, Vol.11 Akademia Nauk Ukr. SSR.1-212 [in Russian].
181. Torka V. 1915. Ichneumoniden der Provinz Posen. Dtsch. Ent. Ztschr., Berlin, 1, 419-428.
182. Torka V. 1918. Ichneumoniden der Provinz Posen. Ent. Rundschau, Stuttgart, 35, 27-28.
183. Torka V. 1926. Beobachtungen über die Eiablage von *Sirex spectrum* L. und den Schmarotzer *Rhyssa persuasoria* L. Anz. Schädlingsk., 2, 166.
184. Torka V. 1928. Ichneumoniden Oberschlesiens. Internationale Entomologische Zeitschrift. 21,347-352, 363-462, 22,21-24, 82-84.
185. Torka V. 1930. Ichneumoniden Oberschlesiens.(Hym.). Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie. 25,199-210.
186. Torka V. 1931. Ichneumoniden Oberschlesiens.(Hym.). Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie. 26,73-77.
187. Torka V. 1939. Eine neue Ichneumoniden-Art (Hym.) aus der Umgegend von Nakło (Pomorze, Polen) nebst ergazendem Verzeichnis von Ichneumoniden aus jener Gegend. Ann. Mus. Zool. Pol., 13 (25), 315-319.
188. Townes H. 1958. Some biological characteristics of the Ichneumonidae (Hymenoptera) in Relation to Biological Control. Jour. Econ. Ent., 51, 650-652.
189. Townes H. 1969. The genera of Ichneumonidae I. Mem. Amer. Ent. Michigan, 11(1), 1-300.
190. Townes H. 1970. The genera of Ichneumonidae. Mem. Ent. Inst. Michigan, 13(3), 1- 307.
191. Townes H. 1971. The genera of Ichneumonidae. Mem. Ent. Inst. Michigan, 17(4), 1-372.
192. Townes H., Townes M. 1960. Ichneumon Flies of America North of Mexico, Subfamilies Ephialtinae, Xoridinae, Acaenitinae. U.S. Nat. Mus. Bull., 216 (2),1-516.
193. Townes H., Momoi S.,Townes M.1965. A catalogue and reclassification of the Eastern Palearctic Ichneumonidae. Mem. Amer. Ent. Inst., 5,1-661.
194. Wahl D. B. 1987. A revision of *Venturia* north of Central America (Hymenoptera, Ichneumonidae). Univ. Kans. Sc. Bull. 53,275-356.
195. Wahl D. B. 1988. A review of the mature larvae of the Banchini and their phylogenetic significance, with comments on the Stilbopinae (Hymenoptera, Ichneumonidae). [In:] V.K Gupta (red.) Advances in Parasitic Hymenoptera Research New York, E. J. Brill. p.546.
196. Wahl D.B. 1990. A review of the mature larvae of Diplazontinae, with notes on larvae of Acaenitinae and Orthocentrinae and proposal of two new ssubfamilies (Insecta, Hymenoptera, Ichneumonidae). J. Nat. Hist. 24, 27-52.
197. Wahl D.B. 1991. The status of Rhimphoctona, with special reference to the higher categories within Campopleginae and the relationships of the subfamily (Hymenoptera, Ichneumonidae). Trans. Am. Ent. Soc. 117,193-213.
198. Wahl D.B. 1991. A new species of *Dusona* from New Zealand, and the application of *Dusona* vs. *Delopia* (Hymenoptera, Ichneumonidae, Campopleginae). Proc. Ent. Soc. Wash. 93, 946-950.
199. Wahl D.B. 1993. Cladistics of the genera of Labeninae (Hymenoptera, Ichneumonidae). Entomologia Generalis 18,91-105.
200. Wahl D.B. 1993. Cladistics of the genera of Mesochorinae (Hymenoptera, Ichneumonidae). Syst. Ent. 18, 371-387.
201. Wahl D.B.1996. Further notes on the family-group names of the Ichneumoninae (Hymenoptera, Ichneumonidae). J. Hym. Res. 5, 273.
202. Wahl D.B 1996. Xenothyriini, a new tribe of Labeninae, and a key to the tribes and genera of Labeninae (Hymenoptera, Ichneumonidae). Proc. Ent. Soc. Wash. 98,158-161.
203. Wahl D.B 1997. The cladistics of the genera and subgenera of Xoridinae. [In:] I.D. Gauld, The Ichneumonidae of Costa Rica 2. Mem. Am. Ent. Inst. 57,454-460.
204. Wahl D.B., Gauld I.D. 1998a. The cladistics and higher classification of the Pimpliformes (Hymenoptera, Ichneumonidae). Syst. Ent. 23,101-134.
205. Wahl D.B., Gauld I.D. 1998b. The cladistics and higher classification of the Pimpliformes (Hymenoptera, Ichneumonidae). Syst. Ent. 23,265-298.
206. Wahl D.B., Mason W.R.M. 1995.The family-group names of the Ichneumoninae (Hymenoptera,Ichneumonidae). J. Hym. Res. 4,285-293.

207. Wiączkowski S. 1957. Entomofauna pniaków sosnowych w zależności od wieku i rozmiaru pniaka. [The entomofauna pine stumps In relation to the age and size of stump] PAN Ekologia Polska S.A. Vol.5. PWN Warszawa [in Polish].
208. Wiączkowski S. 1958. Wyniki hodowli pasożytów owadów leśnych [Results of rearing parasites of the forest insects]. Cz. II. Pol. Pismo Ent., 28, 173-180 [in Polish].
209. Wiączkowski S. K. 1977. Wpływ przemysłowych zanieczyszczeń powietrza na entomofagi skośnika tyczinka i mszyc oraz na inne owady występujące na sośnie w okolicach Tomaszowa Lubelskiego [Influence of the air pollutions on the entomophagous of *Exoteleia dodecella* L. and aphids and other Scot pine insects near Tomaszów Lubelski]. Folia Forestalia Polonica ser. A. z.23 [in Polish].
210. Wiączkowski S. K. 1977. Studies on entomofauna of larch, alder and birch in different environmental conditions and its ecological relationships with insect pests of more important forest tree species. Forest Research Institute and Educational University Kielce, PWN Warszawa pp.172.
211. Wiączkowski S. K. 1984. Wylogówka jedlineczka *Choristoneura murinana* L. w Górzach Świętokrzyskich jej biologia, ekologia i zwalczanie [*Choristoneura murinana* L. in the Świętokrzyskie Mts., its biology, ecology and pest control]. Wyd. Nauk. Rol. I Leś. Ser.A Vol.21. PWN Warszawa [in Polish].
212. Winiarska W. & Anasiewicz A. 1989. Parasitic Hymenoptera reared from eggs and pupae hibernating within apple tree bark near Lublin, Poland. Pol. Pismo Ent. 59, 383-386.
213. Yu D.S. 1993. A proposed system for stabilizing the names of species, illustrated with reference to the Ichneumonidae (Hymenoptera). Bulletin of Zoological Nomenclature. 50(1), 7-12.
214. Yu D.S. & K. Horstmann. 1997. A catalogue of world Ichneumonidae (Hymenoptera) Part1. Subfamilies Acaenitinae to Ophoninae. Mem. Amer. Entomol. Inst. (Gainesville) 58, 1-763.
215. Yu D.S. & K. Horstmann. 1997. A catalogue of world Ichneumonidae (Hymenoptera) Part 2. Subfamilies Orthocentrinae to Xoridinae. Mem. Amer. Entomol. Inst. (Gainesville) 58, 764-1558.
216. Żak B. 1954. Przegląd śląskich gatunków Anomalonini (Hymenoptera, Ichneumonidae) [Review of Silesian species Anomalonini (Hymenoptera, Ichneumonidae)]. Pol. Pismo Ent. 24(10), 1187-1199 [In Polish].

FOOTNOTES

1. *Arotrepes* Townes, 1970 (Cryptinae) - Sawoniewicz, 1978 (Ann. Zool., 34, 121-137) included to this genus *Hemiteles nitidus* Bridgman, 1889, which is a synonym of *Arotrepes perfusor* (Gravenhorst, 1829).
2. *Atractodes* Gravenhorst, 1829 – according to Jussil, R. 1979 (Acta Ent. Fenn. 34, 1-44) this genus comprises 48 species in Europe.
3. *Mastrus* Foerster, 1869 – according to Horstmann (Horstmann K. 1978. Z. Arb. Österr. Ent. 30, 1/2, 65-70) *Mastrus tener* Kriechbaumer, 1893 does not belong to this genus.
4. Horstmann (1990, Z. Arb. Österr. Ent. 42, 1/2, 203) described 10 new European species, of which 5 occur in Poland.
5. *Bathythrix* Foerster, 1869 – according to Sawoniewicz (1980, Ann. Zool. 35, 319-365) there are 21 species known from this genus in Europe.
6. Males from the genus *Cratichneumon* Thomson, 1893 are very similar to males from the genus *Diphyus* Kriechbaumer, 1890. Their correct identification requires good experience.
7. Formerly, this subfamily was named Phygadeuontinae.
8. From the former subfamily Labeninae (Labiinae), the subfamily Brachycyrtinae has been separated.
9. The subfamily Paxylommatainae has previously the status of the family Paxylommataidae.
10. The subfamily Pimplinae has been divide into two subfamilies: Pimplinae and Rhyssinae.

Tadeusz Kaźmierczak

Departament of Forest Entomology Agricultural University In Cracow

Al. 29 Listopada 46, 31-425 Cracow, Poland

e-mail: rlikazmie@cyf-kr.edu.pl

Responses to this article, comments are invited and should be submitted within three months of the publication of the article. If accepted for publication, they will be published in the chapter headed ‘Discussions’ in each series and hyperlinked to the article.